

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Propalin ad us. vet., sciroppo per cani

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Berna

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Vetoquinol SA

Magny-Vernois

70200 Lure

Francia

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Propalin ad us. vet., sciroppo per cani

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 ml contiene:

Principio attivo:

Fenilpropanolamina cloridrato 50 mg

Soluzione da incolore a leggermente giallo-brunastra

4 INDICAZIONE(I)

Per il trattamento della minzione involontaria nella cagna.

5 CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare in animali in gravidanza o in allattamento. Non utilizzare in animali con aritmie cardiache, aumento della pressione sanguigna, problemi renali o aumento della pressione oculare.

6 EFFETTI COLLATERALI

In alcuni casi si possono osservare diarrea, vomito, perdita di appetito, apatia o sovraeccitazione.

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Cane

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Somministrare 0,1 ml/3 kg di peso corporeo 2 volte al giorno tramite cibo secco o umido (corrisponde a 1,5 mg/kg di peso corporeo). Prelevare la quantità appropriata di sciroppo con la siringa e versarlo sul cibo.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Nessune.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Conservare il flacone nella scatola pieghevole per proteggerlo dalla luce.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore: 3 mesi

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sull'etichetta con la dicitura EXP.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Si deve prestare particolare attenzione quando si trattano animali con grave insufficienza renale o epatica, diabete mellito, iperadrenocorticismo, glaucoma, ipertiroidismo o altri disturbi metabolici.

Nelle cagne di età inferiore a 1 anno, la possibilità di incontinenza dovuta a un'anomalia anatomica dovrebbe essere valutata prima del trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

Il cloridrato di fenilpropanolamina è tossico se assunto in sovradosaggio. Gli effetti collaterali possono includere sonnolenza, mal di testa, nausea, insonnia o irrequietezza e aumento della pressione sanguigna.

Un sovradosaggio eccessivo può essere fatale, specialmente per i bambini. Per evitare l'ingestione accidentale, il medicinale veterinario deve essere usato e conservato fuori dalla portata dei bambini. Chiudere sempre bene il tappo dopo l'uso.

In caso di ingestione accidentale, cercare immediatamente aiuto medico e mostrare il foglietto illustrativo. In caso di contatto accidentale con la pelle, lavare la zona interessata con acqua e sapone.

Lavarsi le mani dopo aver usato il prodotto. In caso di contatto accidentale con gli occhi, sciacquare gli occhi con acqua pulita per circa 15 minuti e consultare un medico.

Gravidanza e allattamento:

Non usare nelle cagne durante la gravidanza o l'allattamento.

Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione:

nessun altro medicinale con effetti simili deve essere somministrato durante il trattamento con Propalin.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Nessuna reazione di intolleranza è stata osservata in cani sani fino a cinque volte la dose raccomandata. Tuttavia, un sovradosaggio di fenilpropanolamina può causare sintomi di eccessiva stimolazione del sistema nervoso.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.

Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

22.03.2022

Ulteriori informazioni su questo medicinale veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Scatola con 1 flacone da 30 ml e siringa di dosaggio

Scatola con 1 flacone da 100 ml e siringa di dosaggio

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 56200

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.