

## Information für Tierhaltende

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Profender S Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen

Profender M Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für mittlere Katzen

Profender L Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für schwere Katzen

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaberin:

Vetoquinol AG

Freiburgstrasse 255

3018 Bern

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH

Projensdorfer Straße 324

DE-24106 Kiel

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Profender S Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für kleine Katzen

Profender M Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für mittlere Katzen

Profender L Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen für schwere Katzen

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Jede Einzeldosis (Pipette) von Profender Spot-on enthält:

##### Wirkstoffe:

	Volumen	Emodepsid	Praziquantel
Profender S für kleine Katzen ( $\geq 0.5$ - 2.5 kg)	0.35 ml	7.5 mg	30 mg
Profender M für mittlere Katzen (>2.5 - 5 kg)	0.70 ml	15 mg	60 mg
Profender L für schwere Katzen (>5 - 8 kg)	1.12 ml	24 mg	96 mg

##### Sonstige Bestandteile:

	<b>Volumen</b>	<b>Butylhydroxyanisol (E320) als Konservierungsstoff</b>
Profender S für kleine Katzen ( $\geq 0.5 - 2.5$ kg)	0.35 ml	1.89 mg
Profender M für mittlere Katzen ( $> 2.5 - 5$ kg)	0.70 ml	3.78 mg
Profender L für schwere Katzen ( $> 5 - 8$ kg)	1.12 ml	6.05 mg

Lösung zum Auftropfen

Klare, gelbe bis braune Lösung

#### **4. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Zur Behandlung von Katzen, die gleichzeitig mit Rund- und Bandwürmern befallen sind:

- Spulwürmer und gewisse Spulwurmlarven,
- Hakenwürmer
- Bandwürmer (darunter *Gurkenkernbandwurm* und *Fuchsbandwurm*).

#### **5. GEGENANZEIGEN**

Nicht anwenden bei Katzenwelpen, die jünger als 8 Wochen oder leichter als 0,5 kg sind.

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber einem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil

#### **6. NEBENWIRKUNGEN**

Das Tierarzneimittel schmeckt bitter und das Ablecken der Applikationsstelle unmittelbar nach Auftragen der Lösung kann in sehr seltenen Fällen Speicheln und Erbrechen verursachen. Dies ist kein Zeichen einer Vergiftung und klingt nach kurzer Zeit ohne Behandlung wieder ab. Das korrekte Auftragen erschwert ein Ablecken der Applikationsstelle.

In sehr seltenen Fällen können leichte und vorübergehende Störungen des Nervensystems wie Koordinationsstörungen oder Zittern auftreten. Diese Reaktionen werden vermutlich ebenfalls durch das Ablecken der Applikationsstelle unmittelbar nach der Behandlung verursacht.

In sehr seltenen Fällen kann nach Anwendung von Profender Spot-on vorübergehender Haarausfall, Juckreiz und/oder eine entzündliche Reaktion an der Applikationsstelle auftreten.

Die Angaben zur Häufigkeit von Nebenwirkungen sind folgendermassen definiert:

- Sehr häufig (mehr als 1 von 10 behandelten Tieren zeigen Nebenwirkungen)
- Häufig (mehr als 1 aber weniger als 10 von 100 behandelten Tieren)
- Gelegentlich (mehr als 1 aber weniger als 10 von 1.000 behandelten Tieren)
- Selten (mehr als 1 aber weniger als 10 von 10.000 behandelten Tieren)
- Sehr selten (weniger als 1 von 10.000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte).

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

## 7. ZIELTIERART(EN)

Katze

## 8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Nur zur äusserlichen Anwendung auf der Haut im Nackenbereich.

Jede Einzeldosis (Pipette) von Profender Spot-on enthält:

	Volumen	Emodepsid	Praziquantel
Profender S für kleine Katzen ( $\geq 0.5$ - 2.5 kg)	0.35 ml	7.5 mg	30 mg
Profender M für mittlere Katzen ( $> 2.5$ - 5 kg)	0.70 ml	15 mg	60 mg
Profender L für schwere Katzen ( $> 5$ - 8 kg)	1.12 ml	24 mg	96 mg
Profender für Katzen über 8 kg	Entsprechende Kombination von Pipetten		


Eine einmalige Anwendung ist wirksam. Es wird empfohlen, routinemässig zu entwurmen, normalerweise mindestens alle 3 Monate oder bei festgestelltem Wurmbefall.

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach einem Entwurmungszeitplan für Ihre Katze.

Profender Spot-on kann unbedenklich an Tiere verabreicht werden, die mit ausgewachsenen Herzwürmern infiziert sind, da es unwirksam ist gegen Herzwürmer.

## 9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Nehmen Sie eine Pipette aus der Blisterpackung und halten Sie diese senkrecht. Entfernen Sie den Verschluss durch Drehen und Abziehen. Drehen Sie den Verschluss um und öffnen Sie damit die Versiegelung der Pipette.



Teilen Sie das Fell der Katze im oberen Nackenbereich nahe der Schädelbasis, so dass die Haut sichtbar wird. Setzen Sie die Pipettenspitze auf die Haut und drücken Sie die Pipette mehrmals kräftig, um den Inhalt direkt auf die Haut zu entleeren. Das Auftragen der Lösung nahe der Schädelbasis verringert die Gefahr, dass die Katze die aufgetragene Lösung ablecken kann.



## 10. WARTEZEIT(EN)

Nicht zutreffend

## 11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

## 12. BESONDERE WARNHINWEISE

### Besondere Warnhinweise für jede Zieltierart:

Schamponieren oder Eintauchen des Tieres in Wasser unmittelbar nach der Behandlung kann die Wirksamkeit des Tierarzneimittels einschränken. Aus diesem Grund sollten behandelte Tiere **nicht** gebadet werden, bis die Lösung vollständig getrocknet ist (bis zu 12 Stunden nach Anwendung).

Nach häufiger, wiederholter Anwendung von Arzneimitteln mit ähnlichen Wirkstoffklassen gegen Wurmbefall können die Würmer gegen die Wirkstoffe resistent werden.

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Nur äusserlich auf gesunde Haut auftragen. Nicht eingeben.

Es ist darauf zu achten, dass nach der Anwendung weder die behandelte Katze noch eine andere Katze im gleichen Haushalt die Applikationsstelle ableckt.

Wenn das Tierarzneimittel versehentlich in die Augen gelangt ist, müssen diese sorgfältig mit Wasser gespült werden. Wenn das Tierarzneimittel versehentlich geschluckt wird, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage vorzuzeigen.

Bei Vorliegen einer Infektion mit dem Gurkenkernbandwurm wird eine begleitende Behandlung gegen Flöhe und Haarlinge empfohlen, um einer Reinfektion vorzubeugen, da diese Parasiten den Bandwurm übertragen können.

### Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit der Applikationsstelle, solange diese noch nass ist.

Kinder sind während dieser Zeit von dem behandelten Tier fern zu halten. Nach der Anwendung Hände waschen. Versehentlich auf die Haut des Anwenders gelangte Reste des Tierarzneimittels sofort mit Wasser und Seife entfernen. Wenn das Tierarzneimittel versehentlich in die Augen gelangt ist, müssen diese sorgfältig mit viel Wasser gespült werden. Bei anhaltender Haut- oder Augenreizung, oder wenn das Tierarzneimittel versehentlich geschluckt wurde, ist ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Kindern sollte der lang dauernde, intensive Kontakt (zum Beispiel beim Schlafen) mit behandelten Katzen während der ersten 24 Stunden nach Anwendung des Tierarzneimittels nicht erlaubt werden.

Das in Profender Spot-on enthaltene Lösungsmittel kann auf bestimmten Materialien, z.B. Leder, Textilien, Kunststoffe und polierten Flächen, Flecken verursachen. Vermeiden Sie, dass das Tier nach der Behandlung mit derartigen Materialien in Kontakt kommt, bevor die Applikationsstelle trocken ist.

Echinokokkose (Infektion mit dem Fuchsbandwurm) stellt auch eine Gefahr für den Menschen dar. Da es sich bei der Echinokokkose um eine gegenüber der Weltorganisation für Tiergesundheit (OIE) meldepflichtige Erkrankung handelt, sind hinsichtlich der Behandlung, der Nachkontrollen und des Schutzes von Personen besondere Richtlinien zu beachten.

Fragen Sie Ihren Tierarzt nach weiteren Informationen.

#### Trächtigkeit und Laktation:

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Eine gleichzeitige Behandlung mit gewissen anderen Tierarzneimitteln (z.B. gewissen anderen antiparasitär wirksamen Wirkstoffen) könnte Wechselwirkungen hervorrufen.

Die möglichen klinischen Folgen solcher Wechselwirkungen wurden nicht untersucht.

Bitte fragen Sie Ihren Tierarzt für weitere Informationen dazu.

#### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Für dieses Tierarzneimittel gibt es keine Untersuchungen zu Überdosierungen. Allfällige Folgen sind symptomatisch zu therapieren.

#### Inkompatibilitäten:

Keine bekannt.

**13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Profender Spot-on darf nicht in Gewässer gelangen, da es eine Gefahr für Fische und andere Wasserorganismen darstellen kann.

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

**14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

28.07.2020

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

**15. WEITERE ANGABEN**

Profender S Spot-on ad us. vet.

Schachteln mit 60 Pipetten zu je 0,35 ml in Blisterpackung

Schachteln mit 4 Pipetten zu je 0,35 ml in Blisterpackung

Profender M Spot-on ad us. vet.

Schachteln mit 60 Pipetten zu je 0,70 ml in Blisterpackung

Schachteln mit 4 Pipetten zu je 0,70 ml in Blisterpackung

Profender L Spot-on ad us. vet.

Schachteln mit 60 Pipetten zu je 1,12 ml in Blisterpackung

Schachteln mit 4 Pipetten zu je 1,12 ml in Blisterpackung

Verpackung: Weiße Polypropylen Pipette mit Verschlusskappe in Aluminiumblister

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 57'326

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit dem im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaber in Verbindung.