

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Cefadog[®] 300 quadri ad us.vet., comprimés sécables pour chiens

Cefadog[®] 750 quadri ad us.vet., comprimés sécables pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Ch. De la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

Fabricant responsable de la libération des lots: Ceva Santé animale, Boulevard de la communication, Zone autoroutière, 53950 Louverné, France.

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cefadog[®] 300 quadri ad us.vet., comprimés sécables pour chiens

Cefadog[®] 750 quadri ad us.vet., comprimés sécables pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active :	Cefadog [®] 300 quadri	Cefadog [®] 750 quadri
Céfalexine (sous forme monohydrate)	300 mg	750 mg

Comprimés sécables ronds, de couleur beige, avec une ligne de sécabilité en forme de croix. Les comprimés peuvent être divisés en 4 parties égales.

4 INDICATION(S)

Infection aux germes sensibles à la céfalexine. Traitement des inflammations superficielles et bactériennes de la peau chez le chien.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité à la céfalexine ou aux autres β -lactamines.

Ne pas administrer aux lapins, cochons d'Inde, hamsters ou gerbilles.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

De rares réactions transitoires de vomissements, diarrhées, pertes d'appétit et somnolences inhabituellement prononcées ont été observées.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Pour chiens.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Cefadog® 300 quadri :

Voie orale. 15 mg de céfalexine par kg de poids vif 2 fois par jour, soit un comprimé pour 20 kg de poids vif 2 fois par jour, pendant 21 jour et selon la posologie suivante :

Poids de l'animal	Nombre de comprimés matin et soir	Poids de l'animal	Nombre de comprimés matin et soir
4 - 7 kg	¼	23 - 27 kg	1 ¼
8 - 12 kg	½	28 - 32 kg	1 ½
13 - 17 kg	¾	33 - 37 kg	1 ¾
18 - 22 kg	1	38 - 42 kg	2

Cefadog® 750 quadri :

Voie orale. 15 mg de céfalexine par kg de poids vif 2 fois par jour, soit un comprimé pour 50 kg poids vif 2 fois par jour, pendant 21 jour et selon la posologie suivante :

Poids de l'animal	Nombre de comprimés matin et soir

23 - 31 kg	½
32 - 43 kg	¾
44 - 56 kg	1
57 - 68 kg	1 ¼
69 - 81 kg	1 ½

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Il est conseillé de soutenir le traitement avec un shampoing médical approprié.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas conserver au-dessus de 25°C.

Conserver dans l'emballage d'origine.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

La date de péremption correspond au dernier jour du mois indiqué.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal : Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Dans la mesure du possible, le médicament vétérinaire ne doit être utilisé qu'après un test de sensibilité préalable et en tenant compte des réglementations officielles et locales en vigueur concernant l'utilisation des antibiotiques.

Comme avec les autres antibiotiques excrétés principalement par les reins, une accumulation systémique peut survenir en cas d'atteinte de la fonction rénale. Cela peut nécessiter un ajustement de la dose.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux : Les céphalosporines peuvent provoquer des réactions d'hypersensibilité (allergie) après injection, inhalation, absorption orale ou contact avec la peau. Une hypersensibilité aux pénicillines peut entraîner des réactions d'hypersensibilité aux céphalosporines et inversement. Les réactions

allergiques après l'utilisation de ces substances peuvent parfois être graves. Évitez de manipuler ce médicament vétérinaire si vous êtes hypersensible ou si l'on vous a conseillé d'éviter tout contact avec de tels médicaments vétérinaires. Prenez des précautions lors de la manipulation du médicament vétérinaire afin d'éviter tout contact direct inutile. Lavez-vous les mains après la manipulation. Si vous présentez des symptômes tels qu'une éruption cutanée après l'utilisation, consultez un médecin et montrez-lui cette mise en garde. En cas de symptômes graves, tels qu'un gonflement du visage, des lèvres ou des yeux, ou des difficultés respiratoires, consultez immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin et montrez-lui cette information sur le produit.

Gestation et lactation : Ne pas utiliser chez les chiennes gestantes ou allaitantes.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : Afin de garantir une efficacité, le produit ne doit pas être associé aux antibiotiques bactériostatiques.

L'usage concomitant de céphalosporines de première génération et d'antibiotiques de la famille des aminoglycosides ou de diurétiques, comme le furosémide, est susceptible d'augmenter les risques de néphrotoxicité.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) : Les études réalisées après administration de doses allant jusqu'à 5 fois la dose recommandée de 15 mg/kg 2 fois par jour ont montré que la céfalexine était bien tolérée.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

01.09.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Cefadog® 300 quadri : Etui avec 10 blisters de 10 comprimés.

Cefadog® 750 quadri : Etui avec 1 ou 10 blisters de 10 comprimés.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 57'356

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.