

CEFADOG® 750 quadri

ad. us. vet., teilbare Tabletten
Antibiotikum für Hunde

ZUSAMMENSETZUNG

Cefalexinum (ut monohydricum) 750 mg, Aromatica, Excipients pro Compresso

EIGENSCHAFTEN/ WIRKUNGEN

Cefalexin, ein halbsynthetisches, bakterizides Antibiotikum aus der Familie der β -Laktame (Cephalosporine der ersten Generation) ist wirksam gegen *Staphylococcus intermedius* und *Staphylococcus aureus*, d.h. Bakterien, die häufig für Hautaffektionen beim Hund verantwortlich sind. Cefalexin verursacht eine strukturelle Schädigung der Bakterienwand, welche zu einem Prolaps der zytoplasmatischen Membran führt und dadurch die Bakterien abtötet.

PHARMAKOKINETIK

Die Bioverfügbarkeit beträgt nach peroraler Verabreichung ca. 80%. Die maximale Konzentration beträgt bei Verabreichung gemäss dem empfohlenen Dosierungsschema 16 $\mu\text{g/ml}$ und wird nach 2 Stunden erreicht. Die Halbwertszeit der Ausscheidung beträgt 1,5 Stunden. Die Kinetik von Cefalexin bleibt nach wiederholter Verabreichung unverändert.

INDIKATIONEN

Infektionen verursacht durch Cefalexin-empfindliche Keime. Behandlung der oberflächlichen Pyodermien beim Hund.

DOSIERUNG/ ANWENDUNG

Oral. Zweimal täglich 15 mg Cefalexin pro kg Körpergewicht, d.h. eine Tablette pro 50 kg Körpergewicht zweimal täglich, während 21 Tagen und nach folgender Dosierung:

Gewicht des Tieres	Anzahl Tabletten morgens und abends
23 - 31 kg	$\frac{1}{2}$
32 - 43 kg	$\frac{3}{4}$
44 - 56 kg	1
57 - 68 kg	$1 \frac{1}{4}$
69 - 81 kg	$1 \frac{1}{2}$

Die Behandlung soll mit einem geeigneten Medizinalshampoo unterstützt werden.

ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

Kontraindikationen: Hypersensibilität auf Cefalexin oder andere β -Laktame.

Vorsichtsmassnahmen : Da das Tierarzneimittel aromatisiert ist, besteht die Gefahr, dass Hunde und Katzen die Tabletten gezielt aufsuchen und übermässig aufnehmen. Aus diesem Grund ist das Präparat für Tiere unerreichbar aufzubewahren.

UNERWÜNSCHTE WIRKUNGEN

Selten wurde Erbrechen, Durchfall, Anorexie und Apathie beobachtet.

SONSTIGE HINWEISE

Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Nicht über 25°C aufbewahren.

Im Originalbehältnis aufbewahren.

Hände nach der Anwendung waschen.

Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «Exp.» bezeichneten Datum verwendet werden.

PACKUNG

Packung zu 1 x 10 teilbaren Tabletten.

Packung zu 10 x 10 teilbaren Tabletten.

Stand der Information
Juli 2017.

Zulassungsinhaberin
Biokema SA
Crissier-Lausanne

Swissmedic 57'356 (A)
ATCvet QJ01DB01