

# CEFADOG® 750 quadri

ad. us. vet., comprimés sécables  
Antibiotique pour chien

## COMPOSITION

Cefalexinum (ut monohydricum) 750 mg, Aromatica, Excipients pro Compresso.

## PROPRIÉTÉS/EFFETS

La céfalexine, antibiotique bactéricide semi-synthétique de la famille des  $\beta$ -lactamines (groupe des céphalosporines de première génération), est active vis-à-vis de bactéries impliquées dans les affections dermatologiques du chien telles que *Staphylococcus intermedius* et *Staphylococcus aureus*. Elle agit en induisant une lésion structurelle de la paroi bactérienne, conduisant à un prolapsus de la membrane cytoplasmique, provoquant la mort bactérienne.

## PHARMACOCINÉTIQUE

La biodisponibilité est d'environ 80% après administration par voie orale. La concentration maximale, après administration selon le schéma posologique préconise, est de 16  $\mu\text{g/ml}$ , et est atteinte en 2 heures. La demi-vie d'élimination est de 1,5 heures. La cinétique de la céfalexine reste inchangée à la suite d'administrations répétées.

## INDICATIONS

Affections à germes sensibles à la céfalexine. Traitement des pyodermies superficielles chez le chien.

## POSOLOGIE/MODE D'EMPLOI

Voie orale. 15 mg de céfalexine par kg de poids corporel 2 fois par jour, soit un comprimé pour 50 kg de poids corporel 2 fois par jour, pendant 21 jours et selon la posologie suivante:

Poids de l'animal	Nombre de comprimés	
	matin et soir	
23 - 31 kg	1/2	
32 - 43 kg	3/4	
44 - 56 kg	1	
57 - 68 kg	1 1/4	
69 - 81 kg	1 1/2	

Il est conseillé de soutenir le traitement avec un shampoing médical approprié.

## **LIMITATIONS D'EMPLOI**

Contre-indications:

hypersensibilité à la céfalexine ou aux autres  $\beta$ -lactamines.

Précautions :

Comme les comprimés sont aromatisés, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

## **EFFETS INDÉSIRABLES**

De rares réactions transitoires de vomissements, diarrhées, anorexie et apathie ont été observées.

## **REMARQUES PARTICULIÈRES**

Tenir hors de la portée des enfants. Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Conserver dans l'emballage d'origine. Se laver les mains après utilisation. Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention «Exp.».

## **PRÉSENTATION**

Emballage de 1 x 10 comprimés quadrisécables.

Emballage de 10 x 10 comprimés quadrisécables.

Mise à jour de l'information  
Juillet 2017.

Titulaire de l'autorisation  
Biokema SA  
Crissier-Lausanne

Swissmedic 57'356 (A)  
ATCvet QJ01DB01