

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site
www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

NOROCARP® 20 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

NOROCARP® 50 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

NOROCARP® 100 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché : ufamed AG, Kornfeldstrasse 2, 6210 Sursee, Suisse

Fabricant responsable de la libération des lots : Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, Co. Down, BT35 6JP, Irlande du Nord

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

NOROCARP® 20 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

NOROCARP® 50 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

NOROCARP® 100 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Norocarp® 20 mg comprimés :

1 comprimé : **Substance active** : Carprofène 20 mg

Comprimé rond, blanc à blanc jaunâtre, gravé "20" sur une face et présentant une ligne de sécabilité sur l'autre face. Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

Norocarp® 50 mg comprimés :

1 comprimé : **Substance active** : Carprofène 50 mg

Comprimé rond, blanc à blanc jaunâtre, gravé "50" sur une face et présentant une ligne de sécabilité sur l'autre face. Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

Norocarp® 100 mg comprimés :

1 comprimé : **Substance active** : Carprofène 100 mg

Comprimé rond, blanc à blanc jaunâtre, gravé "100" sur une face et présentant une ligne de sécabilité sur l'autre face. Le comprimé peut être divisé en deux moitiés égales.

4 INDICATION(S)

Anti-inflammatoire pour chiens destiné à diminuer l'inflammation et la douleur en cas de maladies de l'appareil locomoteur ainsi qu'à soulager la douleur après une opération.

5 CONTRE-INDICATIONS

Le carprofène ne doit pas être utilisé chez les chiens dont la fonction rénale, hépatique ou cardiaque est insuffisante, ou chez les chiens souffrant d'ulcères ou de saignements dans le tractus gastro-intestinal. En raison d'un risque accru de lésions rénales, il faut éviter l'utilisation chez les chiens présentant une déshydratation, une baisse du volume sanguin ou une hypotension.

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à l'un des autres composants.

Ne pas administrer aux chats.

Ne pas utiliser immédiatement après un traitement préalable avec d'autres anti-inflammatoires et ne pas administrer simultanément avec de tels principes actifs. La durée d'une pause dans le traitement doit être déterminée par le vétérinaire en fonction des produits utilisés précédemment.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Des effets secondaires tels que vomissements, selles molles/diarrhée, sang dans les selles, perte d'appétit et fatigue ont été rapportés. Ces effets secondaires apparaissent généralement au cours de la première semaine de traitement. Dans la plupart des cas, ils sont transitoires et disparaissent à l'arrêt du traitement, mais dans de très rares cas, ils peuvent être graves ou mettre la vie en danger. Dans de rares cas, des troubles de la fonction rénale ou hépatique peuvent survenir en raison d'une hypersensibilité.

En cas d'apparition d'effets indésirables, il convient d'interrompre l'utilisation du médicament vétérinaire et de consulter le vétérinaire.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1'000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10'000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10'000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Administration par voie orale.

Posologie : 4 mg de carprofène par kg de poids corporel (PC) une fois par jour ou répartis en deux doses égales par jour (correspondant à 1 comprimé de Norocarp® 20 mg ad us. vet. pour 5 kg de PC ou 1 comprimé de Norocarp® 50 mg ad us. vet. pour 12,5 kg de PC ou 1 comprimé de Norocarp® 100 mg ad us. vet. pour 25 kg de PC).

La durée du traitement dépend de la progression clinique de la maladie et des indications du vétérinaire. Un traitement de longue durée doit être effectué sous contrôle régulier d'un vétérinaire. Si aucune amélioration n'est constatée après 14 jours, le cas doit être réévalué.

Les comprimés Norocarp® peuvent être utilisés après une opération pour soulager la douleur et réduire l'inflammation. La posologie est de 4 mg/kg de poids corporel par jour pendant 5 jours.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Aucune.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Les parties de comprimés non utilisées doivent être remises dans le blister. À conserver en dessous de 25°C. Protéger de la lumière. À conserver dans un endroit sec. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP. Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

La dose indiquée ne doit pas être dépassée. L'utilisation chez les chiots de moins de 6 semaines ou chez les animaux âgés est associée à un risque accru. L'utilisation chez ces animaux ne doit donc se faire que sous contrôle strict. Le cas échéant, une réduction de la dose peut s'avérer nécessaire sur les conseils d'un(e) vétérinaire.

En cas d'inflammations dues à des infections bactériennes, un traitement concomitant par des antibiotiques est généralement indiqué.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette. Se laver les mains après avoir manipulé les comprimés.

Gestation et lactation :

L'utilisation chez les chiennes gestantes n'a pas été étudiée et n'est donc pas indiquée.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

Ne pas administrer en même temps que d'autres anti-inflammatoires, des médicaments potentiellement toxiques pour les reins ou fortement liés aux protéines (voir également la rubrique 5).

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères. Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

30.01.2024

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîtes pliantes de 100 comprimés (10 × 10 comprimés dans des blisters en aluminium).

Catégorie de remise B : remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 58'227

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné dans la première section.