

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Vetoquinol AG
Freiburgstrasse 255
3018 Berne

Fabricant responsable de la libération des lots:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Straße 324
DE-24106 Kiel

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Composition:

1 comprimé contient:

Principes actifs:

Emodepside 10mg, praziquantel 50mg

Comprimé marron en forme d'os et une ligne de sécabilité sur chaque face.

Le comprimé peut être divisé en deux moitiés de taille égale.

4. INDICATION(S)

Pour les chiens infestés simultanément par des vers ronds et plats ou exposés à un risque d'infestation simultanée par des vers ronds et plats des espèces suivantes:

- Ascaris lombricoïdes et certaines larves de ces vers
- Ankylostomes
- Trichures et certaines larves de ces vers

- Vers plats (notamment *Dipylidium caninum*, *Echinococcus multilocularis* et *Echinococcus granulosus*)

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiens de moins de 12 semaines ou de moins de 3kg de poids corporel. Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité aux principes actifs ou à l'un des autres composants.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

De légers troubles gastro-intestinaux passagers (salivation et vomissements, par exemple) ainsi que de légers troubles passagers du système nerveux (tremblements et troubles de la coordination, par exemple) ont été observés dans de très rares cas.

Le jeûne nécessaire semble ne pas avoir été respecté dans ces cas-là. Par ailleurs, les bergers collies, les bergers des Shetland et les bergers australiens atteints d'une certaine anomalie génétique peuvent montrer des signes de troubles du système nerveux plus importants (crampes, par exemple). Aucun antidote spécifique n'est connu.

La fréquence des effets secondaires est définie comme suit:

- Très souvent (plus d'un animal traité sur 10)
- Souvent (plus d'un mais moins de 10 animaux traités sur 100)
- Occasionnellement (plus d'un mais moins de 10 animaux traités sur 1000)
- Rarement (plus d'un mais moins de 10 animaux traités sur 10 000)
- Très rarement (moins d'un animal traité sur 10 000, rapports sur des cas particuliers inclus)

En cas d'effets secondaires, notamment non mentionnés dans la notice d'emballage, chez l'animal traité ou de doute quant à l'efficacité du médicament vétérinaire, contacter un vétérinaire ou un pharmacien.

7. ESPÈCE(S) ANIMALE(S) CIBLE(S)


Chien

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens s'administre avec une dose minimale de 1mg d'emodepside par kg de poids corporel et de 5mg de praziquantel par kg de poids corporel conformément au tableau de dosage fourni.

Une seule utilisation par traitement suffit.

« Poids corporel (kg) » « Nombre de comprimés Profender ad us. vet., comprimés pour chiens »
« Profender ad us. vet., comprimés pour chiens »

Körpergewicht (kg)	Anzahl Profender Tabletten	
	Profender Hund	1  = 10kg
> 3 – 5		1/2
> 5 – 10		1
> 10 – 15		1 1/2
> 15 – 20		2
> 20 – 25		2 1/2
> 25 – 30		3
> 30 – 35		3 1/2

Für schwerere Hunde je weitere 5 kg KGW je 1/2 Tablette zusätzlich geben.

« Pour les chiens plus lourds, donner 1/2 comprimé par 5kg de poids corporel supplémentaires. »

À donner à des chiens de plus de 12 semaines et d'au moins 3kg. Les comprimés Profender ad us. vet., comprimés pour chiens possèdent des arômes de viande et sont normalement bien acceptés par les chiens sans nourriture supplémentaire.

9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Administrer uniquement à des chiens à jeun. En cas de traitement matinal, faire jeûner le chien pendant la nuit. Le nourrir à nouveau au plus tôt 4 heures après le traitement.

Ne pas stocker les demi-comprimés restants pour une utilisation ultérieure.

10. DÉLAI(S) D'ATTENTE

Non applicable

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver ce médicament hors de portée des enfants.

Stocker à température ambiante (15-25°C).

Ne plus utiliser ce médicament vétérinaire après la date d'expiration indiquée par EXP sur le contenant.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois concerné.

Ne pas stocker les demi-comprimés restants pour une utilisation ultérieure.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Après une utilisation fréquemment répétée de médicaments avec des principes actifs de classes similaires contre les infestations de vers, ces derniers peuvent devenir résistants à ces principes actifs.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

Administrer uniquement à des chiens à jeun. Voir section 8.

En cas d'infection existante par *Dipylidium caninum*, un traitement d'accompagnement contre les puces et les poux broyeur est recommandé afin de prévenir une réinfection dans la mesure où ces parasites peuvent transmettre des vers plats.

Compte tenu de la présence d'arômes dans ce médicament vétérinaire, chiens et chats peuvent éventuellement se mettre à la recherche des comprimés et les consommer en excès. Il convient donc de conserver cette préparation vétérinaire hors de leur portée.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Se laver les mains après l'administration des comprimés.

En cas d'ingestion accidentelle du médicament vétérinaire, notamment par des enfants, consulter un médecin et se reporter à la notice d'emballage ou à l'étiquette.

L'échinococcose (infection par *Echinococcus multilocularis* ou *Echinococcus granulosus*) présente également un danger pour l'humain. S'agissant d'une maladie à déclaration obligatoire selon l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE), il convient de respecter des directives particulières en matière de traitement, d'inspections de suivi et de protection des personnes.

Consulter un vétérinaire pour de plus amples informations.

Gestation et lactation:

Utilisable lors de la gestation et de la lactation.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

Un traitement simultané avec d'autres médicaments vétérinaires, notamment certains autres principes actifs à effet antiparasitaire, peut éventuellement provoquer des interactions. Les conséquences potentielles de telles interactions n'ont pas été étudiées. Consulter un vétérinaire pour de plus amples informations.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

En cas de dosage jusqu'à cinq fois supérieur aux recommandations, certains chiens – à jeun, comme susmentionné – ont présenté de brefs tremblements musculaires, des troubles de la coordination et une apathie.

Chez certains borders collies atteints d'une anomalie génétique spécifique, de légers et brefs tremblements et/ou des troubles de la coordination ont été observés même en administrant simplement le double de la dose recommandée. Ces symptômes ont complètement disparu sans traitement. L'ingestion d'aliments peu de temps avant ou peu de temps après l'administration de comprimés peut augmenter la fréquence et l'intensité de tels symptômes de surdosage et provoquer occasionnellement des vomissements.

Incompatibilités:

Aucune connue.

13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Mettre au rebut les médicaments vétérinaires non utilisés ou les déchets en résultant conformément aux dispositions en vigueur.

Ne pas stocker les demi-comprimés restants pour une utilisation ultérieure et les mettre dûment au rebut.

Ne pas jeter de médicaments dans les eaux usées ni avec les déchets ménagers.

Demander à un vétérinaire ou à un pharmacien comment mettre au rebut des médicaments devenus inutiles. Ces mesures contribuent à protéger l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIERE NOTICE APPROUVEE

19.06.2020

Des informations supplémentaires concernant ce médicament vétérinaire sont disponibles sur www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Profender ad us. vet., comprimés pour chiens

Boîte de 4 comprimés dans des emballages blister avec film aluminium

Boîte de 24 comprimés dans des emballages blister avec film aluminium

Il est possible que toutes les tailles d'emballage ne soient pas commercialisées.

Catégorie de remise B: Remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 60071 02 003 4 comprimés

Swissmedic 60071 02 004 24 comprimés

Pour de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire, contacter le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné dans la section 1.