

INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Effipro® Spot On Katzen ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon ZH, Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti: Virbac S.A., 1ère Avenue, LID 2065M, 06516 Carros, France

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Effipro Spot On Katzen ad us. vet., soluzione per applicazione topica cutanea

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

1 pipetta (0,5 ml) contiene:

Principio attivo:

Fipronil	50 mg
----------	-------

Eccipienti:

Butilidrossianisolo (E 320)	0,1 mg
Butilidrossitoluene (E 321)	0,05 mg

Soluzione trasparente, da incolore a gialla per applicazione topica cutanea.

4 INDICAZIONE(I)

Trattamento e profilassi in caso di infestazioni da pulci. Trattamento e profilassi in caso di infestazione da zecche. Eliminazione dei pidocchi masticatori. Come parte di un piano terapeutico per il controllo di una dermatite allergica da pulci (DAP).

5 CONTROINDICAZIONI

Non si applicano a:

- Gattini con meno di 2 mesi di età e/o con un peso corporeo inferiore a 1 kg, poiché non si dispone di dati a questo riguardo.
- Animali malati (malattie sistemiche, febbre ecc.) o convalescenti
- Conigli, dato che vi possono essere effetti secondari o potrebbero addirittura morire.
- In caso di ipersensibilità al principio attivo o a uno degli altri componenti.

6 EFFETTI COLLATERALI

Se la soluzione viene leccata, temporaneamente può manifestarsi una maggiore secrezione di saliva, causata principalmente dal solvente veicolante. Fra gli effetti secondari rari vi sono reazioni cutanee passeggere, come arrossamento cutaneo, prurito o perdita di pelo. In alcuni casi eccezionali dopo l'applicazione sono stati osservati anche salivazione, manifestazioni neurologiche reversibili (ipersensibilità, depressione, sintomi nervosi), vomito e sintomi respiratori. Se si dovessero riscontrare nell'animale effetti secondari, in particolare se non menzionati nel foglietto illustrativo, si raccomanda di comunicarlo al veterinario o al farmacista.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, anche quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE


Gatto

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Solo per uso esterno. Soluzione per applicazione topica cutanea.

Dose consigliata: 1 pipetta da 0,5 ml per animale.

Modalità di applicazione: Tenere la pipetta verticale. Picchiettare la parte stretta della pipetta, in modo che tutta la soluzione si trovi nel corpo principale della pipetta. Staccare il tappo della pipetta spot-on piegandolo lungo la linea marcata. Separare il pelo in modo da vedere la pelle. Poggiare sulla pelle la punta della pipetta e schiacciare ripetutamente la pipetta, per versare il contenuto direttamente sulla pelle. Ripetere l'operazione in uno o due altri punti nella zona della nuca del gatto, preferibilmente alla base del cranio e fra le spalle.



Applicando la soluzione vicino alla base del cranio si riduce la possibilità che l'animale possa leccare la soluzione. Il pelo non dovrebbe essere bagnato troppo di soluzione, altrimenti i peli si attaccano assieme nel punto di applicazione. Se questo dovesse succedere, scompare comunque entro 24 ore dal trattamento. Fino a 48 ore dopo il trattamento possono essere visibili residui biancastri della soluzione.

Piano terapeutico:

- Nel caso dei gatti l'azione protettiva contro una nuova infestazione da pulci dura fino a 4 settimane, secondo l'ambiente. L'efficacia contro le zecche permane fino a 2 settimane, secondo l'ambiente.
- Per un'eliminazione e una profilassi ottimali in caso di infestazione da pulci e/o zecche si dovrebbe preparare un piano terapeutico adeguato alla situazione epidemiologica locale.
- Per un'eliminazione ottimale del problema delle pulci in un'abitazione in cui vivono più animali si dovrebbero trattare tutti i cani e i gatti simultaneamente.
- Dermatite allergica da pulci: come parte di un piano terapeutico si consiglia l'applicazione mensile sia sull'animale allergico sia su tutti gli altri cani e gatti che vivono nella stessa casa.
- Fra un trattamento e l'altro si dovrebbe lasciare un intervallo minimo di 4 settimane, dato che la tollerabilità non è stata accertata per intervalli più brevi.

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Per pipette con overblister, deve essere aperta solo immediatamente prima dell'uso.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente.

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Non usare più questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza indicata sulla scatola con la dicitura EXP. Per le pipette con overblister, deve essere aperta solo immediatamente prima dell'uso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C. Conservare in luogo asciutto. Conservare nel contenitore originale.

12 AVVERTENZE SPECIALI

Spesso le pulci degli animali domestici infestano anche il cesta, la cuccia e i posti dove riposa l'animale, come tappeti, mobili imbottiti e auto. Di conseguenza, in caso di forte infestazione e all'inizio della misura di disinfestazione questi posti dovrebbero essere trattati con un insetticida adatto e poi passati periodicamente con l'aspirapolvere.

La soluzione veicolante alcolica può attaccare danneggiare materiali, p.es. superfici dipinte, verniciate o di altro tipo oppure i mobili.

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Evitare un iperdosaggio, perché altrimenti aumenta il rischio di effetti secondari. È importante applicare il farmaco in un punto che l'animale non può leccare e fare in modo che gli animali trattati non possano leccarsi a vicenda. Evitare il contatto con gli occhi dell'animale. Se inavvertitamente il farmaco giunge a contatto degli occhi, bisogna sciacquarli immediatamente e accuratamente con acqua. Non applicare direttamente su ferite o lesioni cutanee. Anche agli animali trattati può capitare che vengano morsi da qualche zecca. Non si può quindi escludere completamente che in condizioni sfavorevoli si verifichi un contagio con una malattia infettiva. Non appena le zecche muoiono, generalmente cadono da sole dall'animale, le eventuali zecche rimaste possono essere eliminate staccandole delicatamente. Non è stato accertato l'influsso di un bagno o uno shampoo sull'efficacia del farmaco nel caso dei gatti. Comunque, in base all'esperienza con i cani lavati con shampoo dopo 2 giorni dal trattamento, si sconsiglia di fare il bagno ai gatti prima che siano trascorsi almeno 2 giorni dall'applicazione del medicinale veterinario.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Questo medicinale veterinario può causare irritazioni delle mucose e degli occhi. Si deve quindi evitare il contatto con la bocca o con gli occhi. Se inavvertitamente il farmaco giungesse a contatto con gli occhi, bisogna sciacquarli immediatamente e accuratamente con acqua. Se l'irritazione agli occhi permane, si deve consultare immediatamente un medico e mostrargli il foglietto illustrativo o l'etichetta. Evitare il contatto con la pelle. Se il farmaco giungesse inavvertitamente a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone la zona contaminata. Dopo l'applicazione lavarsi le mani. Durante l'applicazione evitare di mangiare, bere o fumare. Animali e persone con nota ipersensibilità al fipronil o a uno degli altri componenti dovrebbero evitare il contatto con il farmaco. Evitare il contatto diretto con il punto di applicazione finché è ancora umido. Durante tale periodo i bambini vanno tenuti lontani dall'animale trattato. Si consiglia di trattare gli animali non durante il giorno, bensì alla sera presto. Inoltre gli animali appena trattati non dovrebbero dormire con i proprietari, specialmente se sono bambini. Effipro Spot On Gatti può essere utilizzato anche per le gatte gravide o che allattano.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

Gli imballaggi scaduti o non completamente svuotati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti in conformità alle norme vigenti. Gli imballaggi vuoti devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Il fipronil non deve essere rilasciato nell'ambiente acquatico in quanto può rappresentare un rischio per i pesci e altri organismi acquatici. I medicinali non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedere al proprio medico veterinario come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

25.03.2020. Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Confezione con 4 pipette da 0,5 ml / Confezione da 24 pipette da 0,5 ml

Le scatole contengono pipette con o senza overblister. È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione D: Dispensazione senza prescrizione previa consulenza specialistica
Swissmedic 60'440

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.