

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Nelio® Cat 5 ad us. vet., comprimés à croquer pour chats

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier, hotline@biokema.ch.

Fabricant responsable de la libération des lots : Ceva Santé Animale, Zone autoroutière, 53950 Louverné, France.

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Nelio® Cat 5 ad us. vet., comprimés à croquer pour chats.

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient :

Substance active :

Chlorhydrate de bénazépril 5 mg

Comprimé à croquer.

Comprimé beige en forme de trèfle, marqué pour pouvoir être divisé en demi ou en quart.

4 INDICATION(S)

Pour la réduction de l'excrétion de protéines dans l'urine en cas d'insuffisance rénale chronique chez les chats de plus de 2.5 kg.

5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients de ce médicament.

Ne pas utiliser chez les chats présentant un épaissement pathologique du muscle cardiaque avec un rétrécissement du canal de sortie cardiaque (cardiomyopathie hypertrophique obstructive).

Ne pas utiliser en cas de pression faible (hypotension), de réduction du volume sanguin (hypovolémie), de réduction de la concentration de sodium dans le sang (hyponatrémie) ou d'insuffisance rénale aiguë.

Ne pas utiliser en cas de rétrécissements importants des gros vaisseaux (par exemple, sténose aortique et pulmonaire).

Ne pas utiliser sur les chattes en gestation ou en lactation.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Nelio® Cat peut induire chez un petit nombre de chats l'apparition de diarrhées intermittentes peu sévères. A doses élevées, Nelio® Cat réduit le nombre de globules rouges chez les chats en bonne santé. Cet effet n'a pas été observé chez les chats souffrant d'insuffisance rénale chronique lorsqu'ils ont reçu les doses recommandées. Il est toutefois recommandé, comme dans tous les cas d'insuffisance rénale chronique, de vérifier régulièrement la numération des globules rouges durant le traitement. Dans de rares cas, des vomissements, une perte d'appétit, une déshydratation et un abattement ont été observés chez les chats. Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats.

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

La dose minimale quotidienne est de 0.5 mg de chlorhydrate de bédazépril par kg de poids corporel conformément au tableau suivant :

Poids de l'animal (kg)	Nombre de comprimés
2.5-5	½
5-10	1

En cas d'utilisation de demi-comprimé, remettre le demi-comprimé restant dans l'alvéole de la plaquette thermoformée et l'utiliser lors de la prochaine administration. Les comprimés contiennent des arômes et peuvent être pris spontanément par les chats.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Les comprimés peuvent aussi être administrés directement dans la gueule du chat ou mis dans une bouchée de nourriture, si besoin.

Instructions pour diviser le comprimé : placer le comprimé sur une surface plane, avec sa face sécable retournée (face convexe vers le haut). Avec la pointe de l'index, exercer une légère pression verticale sur le milieu du comprimé pour le casser en deux le long de sa largeur. Ensuite, afin d'obtenir des quarts, exercer une légère pression avec l'index sur le milieu d'une moitié du comprimé pour la casser en deux parties.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver à température ambiante (entre 15°C et 25°C).

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de l'humidité.

Remettre les fractions de comprimés non utilisées dans la plaquette thermoformée et les utiliser dans les 72 heures.

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal : Comme les comprimés contiennent des arômes, il y a un risque que les chiens et les chats les cherchent et les absorbent accidentellement. Pour cette raison, conserver les comprimés hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux :

- Les utilisateurs présentant une hypersensibilité envers le principe actif de Nelio® Cat ou envers un autre principe actif de la même famille doivent éviter le contact avec le produit.
- Les femmes enceintes doivent absolument éviter toute ingestion orale accidentelle car le principe actif de Nelio® Cat et les autres principes actifs de la même famille affectent le développement de l'enfant au cours de la grossesse.
- Se laver les mains après utilisation du médicament.
- Tenir le médicament hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion accidentelle par un enfant, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

Gestation et lactation : L'innocuité de Nelio® Cat n'a pas été testée chez les chats destinés à la reproduction, les chattes en lactation et enceintes. L'utilisation de Nelio® Cat chez ces animaux ne doit se faire qu'après évaluation du rapport bénéfice/risque établie par le vétérinaire responsable.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions : En l'absence d'études sur l'interaction potentielle avec les anti-inflammatoires, l'utilisation de Nelio® Cat 5 avec ces derniers n'est pas recommandée.

Des interactions avec les diurétiques d'épargne potassique ne peuvent être exclues. Afin d'éviter l'apparition de réactions pouvant mettre en danger la vie du patient, il est recommandé au vétérinaire de contrôler régulièrement les taux de potassium plasmatique en cas d'utilisation concomitante de Nelio® Cat et de diurétiques.

Surdosage : Un surdosage accidentel peut provoquer une baisse temporaire et réversible de la pression artérielle. Le traitement est effectué par le vétérinaire. Chez les chats, un surdosage quotidien 10 fois plus élevé sur une période d'un an n'a provoqué aucun symptôme.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Les médicaments vétérinaires non utilisés ou les déchets qui en sont dérivés doivent être éliminés conformément à la réglementation en vigueur.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

25.05.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Etui de 3, 5 ou 10 blisters de 10 comprimés chacun.

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire.

Swissmedic 60'620

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.