

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Meloxoral® 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :

Dechra Veterinary Products Suisse GmbH, Messeplatz 10, 4058 Bâle

kundenservice.ch@dechra.com

Fabricant responsable de la libération des lots :

Produlab Pharma B.V.

Forellenweg 16

4941 SJ Raamsdonksveer

Pays-Bas

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Meloxoral® 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Composition :

1 ml de suspension contient :

Substance active :

1,5 mg de méloxicam

Excipients :

1,75 mg de benzoate de sodium (E211)

Suspension orale

Suspension vert-jaune

4. INDICATION(S)

Pour le traitement des troubles musculo-squelettiques aigus et chroniques, comme p. ex. les ecchymoses, les entorses, les foulures, les boiteries et les processus inflammatoires douloureux affectant le système musculo-squelettique chez les chiens en général

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les animaux souffrant de troubles cardiaques, hépatiques et rénaux cliniquement manifestes, ainsi que chez les chiens présentant un risque d'ulcération gastro-intestinales ou d'hémorragie. Ne pas utiliser chez les animaux présentant des troubles avérés de la coagulation ou en cas d'hypersensibilité individuelle connue au méloxicam ou à l'un des excipients. Ne pas utiliser chez les animaux âgés de moins de 6 semaines.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Des effets indésirables tels que la perte d'appétit, les vomissements, la diarrhée, le méléna, l'apathie et l'insuffisance rénale sont à prévoir.

Ces effets indésirables sont transitoires dans la plupart des cas et disparaissent à la suite de l'arrêt du traitement, mais ils peuvent être sévères ou fatals dans de très rares cas s'ils sont ignorés.

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Administrer une dose unique de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids corporel le premier jour du traitement.

Le traitement se poursuivra par l'administration orale 1 fois par jour (à intervalles de 24 heures) d'une dose d'entretien de 0,1 mg de méloxicam par kg de poids corporel. Ce schéma posologique doit également être utilisé pour les traitements à long terme.


La durée du traitement dépend de l'évolution de la maladie. Une amélioration devrait normalement être observée après 3 à 4 jours de traitement. En l'absence d'amélioration après 10 jours, le traitement doit être arrêté.

9. CONSEIL POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE


Bien agiter avant emploi et respecter scrupuleusement les instructions du vétérinaire !

Meloxoral® 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens doit être administré mélangée aux aliments ou directement dans la gueule.


Dosage du volume à administrer en utilisant la seringue-doseuse :



Bien agiter le flacon !




Adapter la seringue-doseuse sur le compte-goutte du flacon.




1. Tirer sur le piston, jusqu'à atteindre la graduation pour la dose requise.

2. Ajuster la dose à prélever en fonction du poids corporel.



Retirer la seringue-doseuse.



Verser le contenu de la seringue-doseuse sur les aliments.

Éviter de contaminer le flacon et la seringue-doseuse.

Veiller soigneusement à l'exactitude de la dose.

Veillez suivre attentivement les instructions vétérinaires.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

À conserver à température ambiante (entre 15 °C et 25 °C)

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur l'étiquette.

La date de péremption fait référence au dernier jour du mois indiqué.

Durée de conservation après la première ouverture du conditionnement primaire : 6 mois

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières pour chaque espèce cible :

Ce produit pour chiens ne peut pas être utilisé chez les chats car il ne convient pas pour une utilisation dans cette espèce.

Chez les chats, il faut utiliser Meloxoral 0,5 mg/ml suspension orale pour chats.

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal :

L'animal doit être hydraté de manière adéquate pendant le traitement. Les traitements prolongés ne doivent être effectués que sous le contrôle d'un spécialiste et avec des analyses de sang régulières. Ne pas utiliser chez les animaux présentant des troubles de la circulation sanguine en raison du risque d'atteinte rénale.

Comme avec tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le traitement des vieux animaux souffrant de maladies liées à l'âge est associé à un risque accru. Si l'utilisation du Meloxoral ne peut être évitée chez ces animaux, le traitement doit être effectué sous la surveillance clinique étroite d'un vétérinaire. Si des effets indésirables apparaissent, le traitement doit être interrompu et un vétérinaire doit être consulté.

Précautions particulières à prendre pour la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux :

Les personnes qui administrent le médicament vétérinaire aux animaux, doivent suivre les consignes de sécurité suivantes :

Les personnes présentant une hypersensibilité aux anti-inflammatoires non stéroïdiens devraient éviter tout contact direct avec la suspension. En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin.

Gestation et lactation

Meloxoral® 1,5 mg/ml, suspension buvable pour chiens ne doit pas être administré aux chiennes allaitantes ou gestantes.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :

L'administration concomitante avec d'autres médicaments peut augmenter le risque d'effets indésirables et conduire à des symptômes d'intoxication.

Meloxoral® 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens ne devrait pas être administré conjointement avec d'autres anti-inflammatoires et analgésiques.

Un traitement préalable par des substances anti-inflammatoires peut entraîner l'apparition ou l'aggravation des effets indésirables. Par conséquent, le traitement par de tels substances doit être

suspendu pendant au moins 24 heures avant d'utiliser Meloxoral® 1,5 mg/ml suspension orale pour chiens.

Toutefois, les propriétés du produit utilisé précédemment doivent être prises en compte pour déterminer la durée de la période libre de traitement.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

Incompatibilités :

Aucune connue.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

23/06/2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Boîte en carton contenant un flacon de 50 ml avec bouchon de sécurité enfant et une seringue-doseuse

Boîte en carton contenant un flacon de 125 ml avec bouchon de sécurité enfant et une seringue-doseuse

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B : Remise sur ordonnance médicale ou vétérinaire

Swissmedic 61650

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.