

INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Inflacam[®] 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché: Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon.

Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Irlande

2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE (mentionner tous les dosages)

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens

3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 ml de suspension orale contient:

Substance active: Méloxicam 1,5 mg

Excipient: Benzoate de sodium (E 211) 5 mg

Suspension orale de couleur crème à jaunâtre.

4 INDICATION(S)

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) pour chiens.

Pour le traitement des affections aiguës et chroniques de l'appareil locomoteur, telles que les modifications de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux, les affections articulaires, les contusions, les entorses, les foulures, les boiteries et les processus inflammatoires douloureux de l'appareil locomoteur en général.

5 CONTRE-INDICATIONS

Inflacam 1,5 mg/ml ne doit pas être utilisé:

- en cas d'hypersensibilité connue à la substance active ou à un des autres composants;
- chez les chiennes allaitantes ou gestantes;
- chez les animaux présentant des troubles cardiaques, hépatiques ou rénaux cliniquement manifestes, ainsi que les chiens chez lesquels il existe un risque d'ulcère gastro-intestinal ou d'hémorragie;
- chez les animaux présentant des troubles de la coagulation sanguine avérés; et
- chez les animaux âgés de moins de 6 semaines.

6 EFFETS INDÉSIRABLES

Il faut s'attendre aux effets secondaires typiques des anti-inflammatoires non stéroïdiens (surtout au cours des 5 à 14 premiers jours de traitement) tels que perte d'appétit, vomissements, diarrhée, selles goudronneuses, apathie et insuffisance rénale.

Dans la plupart des cas, ces effets secondaires sont transitoires et disparaissent à l'arrêt du traitement, mais ils peuvent dans certains cas être graves ou mettre la vie en danger s'ils ne sont pas pris en compte.

Si vous constatez des effets secondaires, en particulier ceux qui ne sont pas mentionnés dans la notice, chez l'animal traité, ou si vous pensez que le médicament vétérinaire n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chien

8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION





Traitement initial

Dose unique de 0,2 mg de méloxicam par kg de poids corporel.

Traitement d'entretien

A partir du 2^e jour, utiliser par voie orale une fois par jour 0,1 mg de méloxicam par kg de poids corporel (intervalle de 24 heures). Ce schéma posologique doit également être utilisé pour le traitement à long terme.

Le volume à administrer est dosé à l'aide d'une seringue doseuse.

	<p>Bien agiter!</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Placer la seringue sur le flacon avec un mouvement de rotation, faire tourner le flacon et retirer le piston jusqu'à ce que le volume requis soit approximativement atteint. 2. Adapter le volume nécessaire au poids corporel correct.
	<p>Reposer le flacon et retirer la seringue.</p>
	<p>Ajouter le contenu de la seringue à la nourriture.</p>

La durée du traitement dépend de l'évolution clinique de la maladie. Une réponse clinique est généralement obtenue dans les 3 – 4 jours. Si aucune amélioration clinique n'apparaît après 10 jours, le traitement doit être interrompu.

9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Inflacam 1,5 mg/ml doit être administré avec la nourriture ou directement dans la bouche. La prescription du vétérinaire doit être scrupuleusement respectée et le dosage prescrit doit être suivi à la lettre. Il faut éviter de contaminer la seringue de dosage et le contenu restant du flacon pendant l'utilisation. La suspension peut être prélevée à l'aide de la seringue doseuse fournie. La seringue est graduée en kg de poids corporel, ce qui correspond à la dose d'entretien de 0,1 mg de méloxicam / kg de poids corporel.

Bien agiter la suspension avant utilisation.

10 TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le médicament hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15°C - 25°C).

Ne pas utiliser le médicament vétérinaire après la date de péremption indiquée sur le récipient avec EXP.

Durée de conservation après première ouverture/rupture du récipient: 6 mois

12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'emploi chez l'animal:

Une hydratation suffisante doit être assurée pendant le traitement. Les traitements prolongés doivent être effectués sous contrôle de l'état sanguin. Ne pas utiliser chez les animaux présentant une déshydratation, une diminution du volume sanguin et une pression artérielle basse, en raison d'un risque potentiel de lésions rénales.

Ce produit pour chiens ne doit pas être utilisé chez les chats, car il n'est pas adapté à cette espèce. Chez les chats, il convient d'utiliser la préparation Inflacam[®] 0,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chats, qui est autorisée pour cette espèce animale.

Comme pour tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens, le traitement des animaux fragiles en raison de leur âge est associé à un risque accru. Si l'utilisation chez de tels animaux ne peut être évitée, elle doit se faire sous surveillance clinique étroite.

Si des effets indésirables apparaissent, le traitement doit être interrompu et un vétérinaire doit être consulté.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux:

En cas d'ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin et lui montrer la notice ou l'étiquette.

Les personnes présentant une hypersensibilité connue aux anti-inflammatoires non stéroïdiens doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Gestation et lactation:

Inflacam 1,5 mg/ml ne doit pas être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions:

L'association d'Inflacam 1,5 mg/ml avec certains autres médicaments (vétérinaires) peut conduire à des intoxications. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être administré en même temps que d'autres anti-inflammatoires (anti-inflammatoires non stéroïdiens ou glucocorticoïdes).

L'administration simultanée de préparations potentiellement nocives pour les reins doit être évitée.

Un traitement préalable par des substances anti-inflammatoires peut entraîner des effets indésirables supplémentaires ou accrus.

Un traitement préalable avec des substances anti-inflammatoires peut provoquer des effets secondaires supplémentaires ou accrus, c'est pourquoi une période sans traitement d'au moins 24 heures doit être respectée avant de poursuivre le traitement avec ces produits. Pour déterminer la durée de la période sans traitement, le vétérinaire doit tenir compte des propriétés des préparations administrées précédemment.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

En cas de surdosage accidentel, le vétérinaire doit traiter les symptômes.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

23.11.2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens, boîte pliante avec flacon de 15 ml, seringue doseuse incluse

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens, boîte pliante avec flacon de 42 ml, seringue doseuse incluse

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens, boîte pliante avec flacon de 100 ml, seringue doseuse incluse

Inflacam 1,5 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour chiens, boîte pliante avec flacon de 200 ml, seringue doseuse incluse

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 62'533

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné au paragraphe 1.