

## INFORMATION FÜR TIERHALTENDE

Fachinformation für Medizinalpersonen siehe [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### PACKUNGSBEILAGE

Inflacam® 15 mg/ml ad us. vet., orale Suspension für Pferde

#### 1. NAME UND ANSCHRIFT DER ZULASSUNGSINHABERIN UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DER HERSTELLERIN, DIE FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaberin:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domizil: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Für die Chargenfreigabe verantwortliche Herstellerin:

Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Dublin Road, Loughrea, Co. Galway, Ireland

#### 2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Inflacam 15 mg/ml ad us. vet., orale Suspension für Pferde

#### 3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml orale Suspension enthält:

**Wirkstoff:**

Meloxicam 15 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Natriumbenzoat (E211) 5 mg

Weissliche bis schwach gelbfarbene Suspension zum Eingeben.

#### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Linderung von Entzündungen und Schmerzen bei akuten und chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates.

## **5. GEGENANZEIGEN**

Inflacam 15 mg/ml soll nicht angewendet werden bei:

- einer bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem sonstigen Bestandteil;
- säugenden oder trächtigen Stuten;
- Tieren mit Magen-Darm-Störungen, speziell bei Blutungen und Blutungsstörungen, verminderter Leber-, Herz- oder Nieren-Funktion;
- gleichzeitiger Behandlung mit Entzündungshemmern oder Medikamenten zur Hemmung der Blutgerinnung;
- Tieren mit nachgewiesenen Blutgerinnungsstörungen sowie
- Fohlen, die jünger als 6 Wochen alt sind.

## **6. NEBENWIRKUNGEN**

Vereinzelte Fälle von vorübergehenden Nebenwirkungen wie leichtes Nesselfieber und Durchfall wurden beobachtet. In sehr seltenen Fällen (weniger als 1 von 10 000 behandelten Tieren, einschliesslich Einzelfallberichte) wurden Appetitlosigkeit, Schläfrigkeit, Bauchschmerzen und Dickdarmentzündung berichtet. In sehr seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten, die schwerwiegend (auch tödlich) sein können.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, sollte die Behandlung abgebrochen und ein Tierarzt aufgesucht werden. Falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt mit.

## **7. ZIELTIERART(EN)**

Pferd

## **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Inflacam 15 mg/ml wird einmal täglich in einer Dosis von 1 ml/25 kg Körpergewicht (KGW) (d.h. 0,6 mg Meloxicam pro kg KGW) mit dem Futter oder direkt in das Maul verabreicht. Maximale Therapiedauer: 14 Tage.

## **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Die Suspension vor der Anwendung gut schütteln.

Die Suspension sollte mit Hilfe der jeder Packung beiliegenden Dosierspritze verabreicht werden. Die Spritze passt auf den Behälter der Suspension und weist eine Graduierung in kg Körpergewicht auf. Verunreinigung von Dosierspritze und verbleibendem Flascheninhalt während der Anwendung sind zu vermeiden.

## **10. WARTEZEIT(EN)**

Essbare Gewebe: 3 Tage

Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Konsum vorgesehen ist.

## **11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur lagern (15°C – 25°C).

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit EXP angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen/Anbruch des Behältnisses: 3 Monate

## **12. BESONDERE WARNHINWEISE**

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Während der Behandlung ist für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu sorgen.

Längere Behandlungen sollten unter Kontrolle des Blutstatus durchgeführt werden.

Nicht anwenden bei Tieren mit Flüssigkeitsmangel, vermindertem Blutvolumen und tiefem Blutdruck, da ein mögliches Risiko einer Nierenschädigung besteht.

Wie bei allen nichtsteroidalen Antiphlogistika ist die Behandlung von altersschwachen Tieren mit einem erhöhten Risiko verbunden. Wenn die Anwendung bei solchen Tieren nicht vermieden werden kann, so hat dies unter genauer klinischer Beobachtung zu geschehen.

Beim Auftreten von unerwünschten Wirkungen, sollte die Behandlung abgebrochen und ein Tierarzt aufgesucht werden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber nichtsteroidaler Entzündungshemmer sollten den Kontakt mit dem Tierarzneimittel vermeiden.

Bei versehentlicher Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

### Trächtigkeit und Laktation:

Laborstudien bei Rindern haben keine Anzeichen von Missbildungen oder Schädigung des Embryos oder Vergiftung der Mutterkuh gezeigt. Jedoch existieren keine Daten bei Pferden. Deshalb ist der Gebrauch bei Stuten während der Trächtigkeit oder der Säugezeit/Laktation nicht empfohlen.

### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Inflacam 15 mg/ml sollte nicht zusammen mit anderen Entzündungshemmern, Medikamenten zur Hemmung der Blutgerinnung oder Glukokortikoiden verabreicht werden (siehe Abschnitt 5 Gegenanzeigen).

Eine Vorbehandlung mit entzündungshemmenden Mitteln kann als Folge zusätzliche oder verstärkte Nebenwirkungen hervorrufen. Daher sollte vor dem Einsatz von Inflacam 15 mg/ml die Behandlung mit solchen Mitteln für mindestens 24 Stunden ausgesetzt werden.

Bei der Dauer der behandlungsfreien Zeit sollte der Tierarzt die Eigenschaften der zuvor verabreichten Präparate berücksichtigen.

### Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Im Falle einer versehentlichen Überdosierung sind durch den Tierarzt die Symptome zu behandeln.

## **13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Massnahmen dienen dem Umweltschutz.

## **14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE**

23.11.2022

Weitere Angaben zu diesem Tierarzneimittel finden Sie unter [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) und [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15. WEITERE ANGABEN**

Inflacam 15 mg/ml ad us. vet., orale Suspension für Pferde, Faltschachtel mit Flasche zu 100 ml, inklusive Dosierspritze

Inflacam 15 mg/ml ad us. vet., orale Suspension für Pferde, Faltschachtel mit Flasche zu 250 ml, inklusive Dosierspritze

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in Verkehr gebracht.

Abgabekategorie B: Abgabe auf tierärztliche Verschreibung

Swissmedic 62'534

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der im 1. Abschnitt genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.