INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site www.tierarzneimittel.ch

NOTICE D'EMBALLAGE

Veraflox® 25 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour les chats

1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :
Elanco Santé Animale SA
Mattenstrasse 24A
4058 Bâle

Fabricant responsable de la libération des lots :
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Allemagne

2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Veraflox® 25 mg/ml ad us. vet., suspension orale pour les chats

3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

Composition :

1 ml de la suspension orale contient :

Substance active :

25 mg de pradofloxacine

Excipients :

2 mg d'acide sorbique (E200)
0,2 mg d'acide ascorbique (E300)

Suspension orale
Suspension de couleur jaunâtre à beige

4. INDICATION(S)

Pour le traitement des chats atteints de :

- Infections aiguës des voies respiratoires causées par des souches sensibles de Pasteurella multocida, d'Escherichia coli et du groupe Staphylococcus intermedius (y compris S. pseudintermedius),
- Infections des plaies et abcès causés par des souches sensibles d'Asteurella multocida et du groupe Staphylococcus intermedius (y compris S. pseudintermedius).

5. CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chats en cas d'hypersensibilité au principe actif ou à l'un des excipients.
En l'absence de données disponibles, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisée chez les chatons de moins de 6 semaines.
Le médicament vétérinaire n'a pas d'effet néfaste sur le cartilage articulaire en développement des chatons âgés de 6 semaines et plus. Cependant, le médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé chez les chats présentant des lésions persistantes du cartilage articulaire, dans la mesure où le traitement pourrait entraîner une aggravation de ces lésions.
Ne pas utiliser chez les chats atteints de troubles du système nerveux central (SNC) comme l'épilepsie, le médicament vétérinaire pouvant induire des convulsions chez ces animaux.

6. EFFETS INDÉSIRABLES

Dans de rares cas, des troubles gastro-intestinaux légers et transitoires ainsi que des vomissements ont été observés.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :
- Très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités),
- Fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités),
- Peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1000 animaux traités),
- Rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités),
- Très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés).

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chats

8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

À utiliser uniquement sur les animaux !

La dose recommandée pour la substance active pradofloxacine est de 5 mg/kg de poids corporel une fois par jour. En fonction de la graduation de la seringue, la dose est comprise entre 5 et 7,5 mg/kg de poids corporel comme le montre le tableau ci-dessous.
Le poids corporel devra être déterminé avec précision pour déterminer le dosage correct et éviter tout sous-dosage.
Pour faciliter l'administration de la dose exacte, une seringue de 3 ml (graduée de 0,1 à 2 ml) pour administration orale est fournie avec le conditionnement en flacon de 15 ml.

Poids corporel du chat en kg	Dose de suspension orale (ml)	Plage de dosage de la pradofloxacine (mg/kg de poids corporel)
> 0,67 – 1	0,2	5 – 7,5
1 – 1,5	0,3	5 – 7,5
1,5 – 2	0,4	5 – 6,7
2 – 2,5	0,5	5 – 6,3
2,5 – 3	0,6	5 – 6,0
3 – 3,5	0,7	5 – 5,8
3,5 – 4	0,8	5 – 5,7
4 – 5	1,0	5 – 6,3
5 – 6	1,2	5 – 6,0
6 – 7	1,4	5 – 5,8
7 – 8	1,6	5 – 5,7
8 – 9	1,8	5 – 5,6
9 – 10	2,0	5 – 5,6

9. CONSEIL POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE

Durée du traitement

La durée du traitement doit être déterminée par le vétérinaire et dépend du type et de la gravité de la maladie et de la réponse de l'animal au traitement. Pour la plupart des infections, les plans de traitement suivants sont recommandés :

Domaine d'application	**Durée du traitement (en jours)**
Infections des plaies et abcès	7
Infections aiguës des voies respiratoires supérieures	5

Le vétérinaire traitant doit être consulté en l'absence d'amélioration après 3 jours de traitement.

Voie d'administration



Agiter avant utilisation	Prélever la quantité appropriée à l'aide de la seringue	Administrer directement dans la gueule

Agiter vigoureusement le flacon pendant 10 secondes pour obtenir une suspension homogène.
Pour éviter toute contamination croisée, s'assurer de ne pas utiliser la même seringue pour plusieurs animaux. Utiliser une seringue distincte pour chaque animal traité. Après administration, nettoyer la seringue à l'eau du robinet et la ranger dans la boite en carton avec le médicament vétérinaire.

10. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

En raison d'effets nocifs potentiels, tenir les flacons et les seringues remplies **hors de la vue et de la portée des enfants**.
À conserver en dessous de 30 °C.
Ne pas utiliser après la date d'expiration.
Conserver le flacon soigneusement fermé.
Durée de conservation après la première ouverture : 3 mois.

12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)

Précautions particulières d'emploi chez l'animal

- Le médicament vétérinaire ne doit être utilisé qu'après confirmation bactériologique du diagnostic et de l'antibiogramme des agents pathogènes impliqués. Les recommandations en matière d'utilisation des antibiotiques doivent être prises en compte lors de l'utilisation.
- Le médicament vétérinaire doit être réservé au traitement d'affections cliniques ayant mal répondu ou susceptibles de mal répondre à d'autres classes d'antibiotiques.

- L’utilisation non conforme du médicament vétérinaire peut augmenter la prévalence des bactéries résistantes et diminuer l’efficacité des autres traitements.
- Le médicament vétérinaire peut augmenter la sensibilité de la peau aux rayons du soleil. Il est donc conseillé d’éviter une exposition excessive au soleil pendant le traitement des animaux.

Précautions particulières à prendre pour la personne qui administre le médicament vétérinaire aux animaux

Les personnes présentant une hypersensibilité connue doivent éviter tout contact avec le médicament vétérinaire.

Le contact direct du médicament vétérinaire avec la peau et les yeux doit être évité. Se laver les mains après utilisation. En cas de contact accidentel du médicament vétérinaire avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau. En cas de contact accidentel du médicament vétérinaire avec la peau, rincer la zone touchée à l’eau.

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du médicament vétérinaire.

En cas d’ingestion accidentelle du médicament vétérinaire, consulter un médecin et lui montrer la notice fournie.

Gestation et lactation

Ne pas utiliser chez les chattes gestantes ou allaitantes car la sécurité du médicament vétérinaire pendant la gestation et l'allaitement n'a pas été établie.

Gestation

Ne pas utiliser durant la gestation.

Lactation

Ne pas utiliser pendant la lactation.

Ne pas administrer aux chatons de moins de 6 semaines.

Le médicament vétérinaire est connu pour passer dans le lait.

Fertilité

L'utilisation du médicament vétérinaire n'a montré aucun effet sur la fertilité des animaux reproducteurs.

Interactions médicamenteuses ou autres formes d’interactions

Certains médicaments ne doivent pas être administrés à l'animal pendant le traitement car ils sont susceptibles de provoquer de graves effets indésirables. Informez votre vétérinaire si vous donnez un médicament à votre animal.

Veraflox ne doit pas être utilisé avec des antiacides, du sucralfate, des préparations multivitaminées ou des produits laitiers.

Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes)

Les vomissements et les selles molles peuvent être des symptômes de surdosage.

Il n'existe pas d'antidote spécifique connu.

Incompatibilités

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament vétérinaire ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments vétérinaires.

13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE

23/06/2022

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament vétérinaire aux adresses www.swissmedic.ch et www.tierarzneimittel.ch.

15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Flacon de 15 ml avec une seringue doseuse pour l'administration orale

Catégorie de remise A : remise sur ordonnance vétérinaire non renouvelable

Swissmedic 62588

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.