INFORMAZIONE PER PROPRIETARIE E PROPRIETARI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito www.tierarzneimittel.ch

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Veraflox® 25 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per gatti

1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:
Elanco Tiergesundheit AG
Mattenstrasse 24A
4058 Basilea

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
D-24106 Kiel
Germania

2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Veraflox® 25 mg/ml ad us. vet., sospensione orale per gatti

3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Composizione:
1 ml di sospensione orale contiene:
Principio attivo:
Pradofloxacina 25 mg
Eccipienti:
Acido sorbico (E200) 2 mg
Acido ascorbico (E300) 0.2 mg

Sospensione da somministrare per via orale
Sospensione da giallastra a beige

4 INDICAZIONE(I)

Trattamento sistemico di gatti in caso di:

- infezioni acute del tratto respiratorio superiore causate da ceppi sensibili di Pasteurella multocida, Escherichia coli e del gruppo Staphylococcus intermedius (incluso S. pseudointermedius);
- infezioni di ferite e ascessi causati da ceppi sensibili di Pasteurella multocida e del gruppo Staphylococcus intermedius (incluso S. pseudintermedius).

5 CONTROINDICAZIONI

Non usare per gatti con ipersensibilità nota al principio attivo o a un altro componente.
Per la mancanza di dati, il medicinale veterinario non deve essere usato nei gattini con meno di 6 settimane d'età.
Il medicinale veterinario non ha alcun effetto dannoso sullo sviluppo della cartilagine nei gattini di 6 settimane d'età o più. Comunque il prodotto non deve essere utilizzato nei gatti con lesioni articolari cartilaginee croniche, poiché tali lesioni possono peggiorare durante il trattamento.
Non impiegare in gatti con disturbi del sistema nervoso centrale (SNC), come epilessia, perché il medicinale veterinario può provocare convulsioni in animali predisposti.

6 EFFETTI COLLATERALI

In rari casi sono stati osservati lievi disturbi gastrointestinali transitori e vomito.

La frequenza degli effetti collaterali è definita usando le seguenti convenzioni:
- molto comune (più di 1 su 10 animali trattati mostra effetti collaterali durante il trattamento)
- comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali trattati)
- non comune (più di 1 ma meno di 10 animali su 1000 animali trattati)
- raro (più di 1 ma meno di 10 animali su 10 000 animali trattati)
- molto raro (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate).

Se nell'animale trattato dovessero manifestarsi effetti collaterali, in particolare quelli che non sono già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il veterinario o il farmacista.

7 SPECIE DI DESTINAZIONE

Gatti

8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Utilizzare solo negli animali!

La dose raccomandata del principio attivo pradofloxacina è di 5,0 mg/kg di peso corporeo una volta al giorno. Poiché la siringa è graduata, la dose risultante da prelevare secondo la seguente tabella è di 5 - 7,5 mg/kg di peso corporeo.
Il peso corporeo deve essere determinato esattamente per assicurare la dose corretta ed evitare un sottodosaggio.
Per facilitare un accurato dosaggio, il flacone da 15 ml di Veraflox sospensione orale viene fornito con una siringa dosatrice orale da 3 ml (graduazione: da 0,1 a 2 ml).

Peso corporeo del gatto in kg	Dose da somministrare della sospensione (ml)	Dose di Pradofloxacina (mg/kg di peso corporeo)
> 0,67 – 1	0,2	5 – 7,5
1 – 1,5	0,3	5 – 7,5
1,5 – 2	0,4	5 – 6,7
2 – 2,5	0,5	5 – 6,3
2,5 – 3	0,6	5 – 6,0
3 – 3,5	0,7	5 – 5,8
3,5 – 4	0,8	5 – 5,7
4 – 5	1,0	5 – 6,3
5 – 6	1,2	5 – 6,0
6 – 7	1,4	5 – 5,8
7 – 8	1,6	5 – 5,7
8 – 9	1,8	5 – 5,6
9 – 10	2,0	5 – 5,6

9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Durata del trattamento

La durata del trattamento dovrebbe essere stabilita dal veterinario e dipende dalla natura e dalla gravità dell'infezione e dalla risposta dell'animale al trattamento. Per la maggior parte delle infezioni saranno sufficienti i seguenti cicli di trattamento:

Indicazione	**Durata del trattamento (in giorni)**
Ferite infette e ascessi	7
Infezioni acute del tratto respiratorio superiore	5

Consultare il veterinario curante se non si nota alcun miglioramento dopo 3 giorni dall'inizio del trattamento.

Modalità di somministrazione



Agitare prima dell'uso	Aspirare nella siringa il dosaggio adeguato	Somministrare direttamente in bocca

Per ottenere una sospensione omogenea, agitare energicamente il flacone per 10 secondi.
Al fine di evitare contaminazioni crociate, non deve essere utilizzata la stessa siringa per parecchi animali. Per ogni animale utilizzare una siringa diversa. Dopo la somministrazione, la siringa deve essere lavata con acqua del rubinetto e conservata nella scatola unitamente al medicinale veterinario.

10 TEMPO(I) DI ATTESA

Non pertinente

11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

A causa dei possibili effetti negativi per la salute, i flaconi e le siringhe riempite **devono essere tenuti fuori dalla portata e dalla vista dei bambini.**
Conservare a temperatura non superiore a 30°C.
Non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza.
Conservare il flacone ben chiuso.
Periodo di validità dopo prima apertura / il primo utilizzo del flacone: 3 mesi

12 AVVERTENZE SPECIALI

Avvertenze particolari per l'uso negli animali

- Il medicinale veterinario deve essere utilizzato solo dopo la conferma batteriologica della diagnosi e il test di suscettibilità dei patogeni coinvolti. Durante l'uso osservare le linee guida per gli antibiotici.

- Il medicinale veterinario deve essere riservato al trattamento di condizioni cliniche che hanno risposto in modo inadeguato ad altre classi di antibiotici o per le quali si prevede una risposta inadeguata.
- Un uso del medicinale veterinario diverso da quello indicato può aumentare l'incidenza di batteri che mostrano resistenza e quindi ridurre l'efficacia di un ulteriore trattamento.
- Il medicinale veterinario può aumentare la sensibilità della pelle alla luce solare. Pertanto, gli animali non devono essere sovraesposti alla luce solare durante il trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Le persone con nota ipersensibilità devono evitare ogni contatto con il medicinale veterinario
Evitare il contatto del medicinale veterinario con la pelle e gli occhi. Lavare le mani dopo l'uso. Se il medicinale veterinario è entrato accidentalmente negli occhi, questi devono essere sciacquati immediatamente con molta acqua. Se il medicinale veterinario finisce accidentalmente sulla pelle, sciacquare l'area interessata con acqua.
Non mangiare, bere o fumare mentre si maneggia il medicinale veterinario.
In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente a un medico e mostrargli il foglietto illustrativo.

Gravidanza e allattamento

Non utilizzare nelle gatte in gravidanza o in allattamento, poiché la sicurezza del medicinale veterinario durante la gravidanza e l'allattamento non è stata dimostrata.

Gravidanza

Non usare durante la gravidanza.

Allattamento

Non usare durante l'allattamento.
Non utilizzare nei gatti di età inferiore a 6 settimane. È noto che il medicinale veterinario arriva nel latte materno.

Fertilità

L'utilizzo del medicinale veterinario ha dimostrato di non avere effetti sulla fertilità negli animali da riproduzione.

Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione

Ci sono alcuni farmaci che non devono essere somministrati all'animale durante il trattamento, in quanto ciò può causare gravi effetti collaterali. Informi il suo veterinario di tutti i farmaci che utilizza per il suo animale.
Veraflox non deve essere utilizzato con antiacidi, sucralfato, multivitaminici o prodotti caseari.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)

Vomito e feci molli possono essere sintomi di un sovradosaggio.

Non sono noti antidoti specifici.

Incompatibilità

In assenza di studi di compatibilità, questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO

I medicamenti non devono essere smaltiti nelle acque di scarico o nei rifiuti domestici.
Chiedere alla/al propria/a veterinaria/ veterinario o alla/al propria/o farmacista come fare per smaltire i medicamenti di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente.

14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

23.06.2022

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su www.swissmedic.ch e www.tierarzneimittel.ch.

15 ALTRE INFORMAZIONI

Flacone da 15 ml con siringa dosatrice per somministrazione orale

Categoria di dispensazione A: dispensazione una tantum su prescrizione veterinaria
Swissmedic 62588

Se si desiderano ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato alla sezione 1.