

FORMIVAR 60% ad us. vet., Lösung
Organische Säure mit akarizider Wirkung
Ameisensäure zur Behandlung der Varroose der Honigbiene (*Apis mellifera*)

Zusammensetzung:

100 g Formivar 60% ad us. vet. enthält als Wirkstoff 70.6 g Ameisensäure 85% und 29.4 g Wasser als Hilfsstoff.

Eigenschaften/Wirkungen:

Ameisensäure führt zu einer Atemhemmung und Übersäuerung der Varroamilben. Diese reagieren empfindlicher auf Ameisensäure als Bienenlarven und adulte Bienen.

Indikation:

Varroose der Honigbiene (*Apis mellifera*)

Dosierung/Anwendung:

Zum Verdunsten über dem Brutraum mit Hilfe eines geeigneten Applikators. Zur korrekten Handhabung die Gebrauchsanleitung des verwendeten Applikators konsultieren. Die Behandlung erfolgt zweimal im Jahr, einmal direkt nach der Honigernte und das zweite Mal nach einer Phase der Auffütterung vor der Brutpause (Juli/August bzw. September). Weitere Angaben insbesondere auch Dosierung und einzuhaltende Umgebungstemperatur sind der aktuellen Ausgabe des „Leitfadens Bienengesundheit“ des Zentrums für Bienenforschung zu entnehmen. www.apis.admin.ch.

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen: Nicht während der Tracht anwenden.

Vorsichtsmassnahmen: Die Wirksamkeit hängt unter anderem von der Beutenart (Schweizerkasten, Dadantmagazin, Zander etc.), von den Wetterverhältnissen während der Behandlung und vom verwendeten Verdampfungsgerät ab.

Unerwünschte Wirkungen:

Die offene Brut kann geschädigt werden. Bei Überdosierungen sind Brutverluste und Königinnenverluste möglich.

Absetzfristen:

Honig: Keine. Anwenden nach der letzten Honigernte des Jahres. Bei einer Behandlung im Frühling während der Trachtzeit (Notbehandlung), darf der Honig aus einer allfälligen 2. Tracht in diesem Falle wegen Rückständen nicht in Verkehr gebracht werden.

Sonstige Hinweise:

Im Freien oder gut belüfteten Räumen arbeiten. Die Lösung verursacht Verätzungen! Dämpfe nicht einatmen! Beim Arbeiten mit Ameisensäure sind säurefeste Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen. Freie Hautpartien bedecken. Genügend Wasser zum Spülen bereithalten oder in der Nähe von fliessendem Wasser arbeiten. Augendusche bereithalten. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Unter 30°C lagern. Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Vor Frost schützen. Im Originalbehältnis aufbewahren. Aufrecht lagern. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen. Nicht aufgebrauchte Mengen des Tierarzneimittels sind vor der Entsorgung stark mit Wasser zu verdünnen (mindestens im Verhältnis **1:10**).

Packungen: 1000 ml Flaschen

Zulassungsinhaberin: Andermatt BioVet AG, Grossdietwil

Stand der Information: Februar 2019

Chargen Nr. / Verwendbar bis: Siehe Aufdruck

SWISSMEDIC Nr.: 62888 03

ATCvet Code: QP53AG01

