

FORMIVAR 60% ad us. vet., soluzione
Acido organico con effetto acaricida
Acido formico per il trattamento della varroasi delle api (*Apis mellifera*)

Composizione:

100 g Formivar 60% ad us. vet. contengono come principio attivo 70.6 g d'acido formico 85% e 29.4 g d'acqua come eccipiente.

Proprietà/Effetti

L'acido formico porta all'inibizione delle vie respiratorie e all'acidificazione dell'acaro Varroa. Questi ultimi sono più sensibili all'acido formico delle larve delle api e delle api adulte.

Indicazioni

Varroasi delle api (*Apis mellifera*)

Posologia/Usa

L'acido formico agisce per evaporazione tramite un applicatore apposito posto sopra la camera di covata. Per un corretto utilizzo dell'applicatore consultare le istruzioni per l'uso. Il trattamento avviene due volte l'anno; la prima volta dopo il raccolto del miele, la seconda dopo una fase di allevamento prima della pausa di covata (luglio/agosto ovvero settembre). Ulteriori informazioni riguardo il dosaggio e la temperatura d'ambiente da rispettare, sono specificate nell'attuale edizione del "Leitfaden Bienengesundheit" del centro di ricerche sulle api. www.apis.admin.ch.

Limitazioni d'uso

Controindicazioni: Non applicare durante il flusso nettareo.

Misure precauzionali: L'efficacia del prodotto dipende tra l'altro dai diversi tipi di arnie (Arnia Dadant ecc.), dalle condizioni meteorologiche durante il trattamento e dall'uso dell'evaporatore.

Effetti collaterali

La covata aperta può essere danneggiata. In caso di eccesso del dosaggio si possono verificare perdite di covata e regine.

Termini d'attesa

Miele: nessuno. Applicare dopo l'ultima raccolta di miele dell'anno. Durante un trattamento primaverile, nel periodo di flusso nettareo (trattamento di emergenza), il miele proveniente da un'eventuale 2° flusso nettareo, non può essere messo in commercio per via dei residui.

Altre indicazioni

Lavorare all'aperto o in una stanza ben ventilata. La soluzione può provocare ustioni! Non inalare i vapori! Durante l'uso dell'acido formico è necessario usare guanti di protezione resistenti all'acido e degli occhiali di protezione adeguati. Coprire parti di pelle scoperte. Per sciacquare tenere a portata di mano acqua a sufficienza oppure lavorare vicino all'acqua corrente. Tenere a portata di mano il collirio. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente gli occhi con acqua corrente, consultare un medico. In caso di incidente o di malessere consultare un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare ad una temperatura inferiore a i 30 gradi. Non conservare in frigorifero. Non congelare. Proteggere dal gelo. Conservare nel contenitore originale. Conservare in posizione verticale. Evitare di esporre alla luce solare diretta. Gli importi non utilizzati del prodotto vanno diluiti con molta acqua prima dello smaltimento (almeno **1:10**).

Confezioni

Bottiglia di 1000 ml

Titolare dell'omologazione

Andermatt BioVet AG, Grossdietwil

Stato dell'informazione

Febbraio 2019

Lotto N° / Scade: Vedi etichetta

SWISSMEDIC N°: 62888 03

ATCvet Code: QP53AG01

