

Theranechron D6 ad us. vet., Injektionslösung

Streuli Tiergesundheit AG

Homöopathisches Arzneimittel zur subkutanen Injektion für Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunde, Katzen

Zusammensetzung

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff:

Tarantula cubensis D6 1 ml

Hilfsstoffe:

Ethanolum, aqua ad injectabilia

Dieses Tierarzneimittel enthält ca. 30 Gew.-% Ethanol (Alkohol).

Indikationen

Gemäss dem homöopathischen Arzneimittelbild kann Theranechron D6 ad us. vet. auf Verschreibung Ihres Tierarztes bei folgenden Anwendungsgebieten eingesetzt werden:

Phlegmonen, Geschwüre, Karbunkel, Furunkel und eitrig nekrotisierende Prozesse. Entzündliche Klauenerkrankungen (Panaritien), Hauteiterungen, Septische Zustände. Purpurfärbung und äusserst schmerzhaft Veränderungen. Fördert die Demarkation.

Dosierung / Anwendung

Zur subkutanen Anwendung.

Dosierung:

Rind, Pferd	5 – 10 ml
Schaf, Ziege	3 – 5 ml
Schweine	3 – 6 ml
Hunde	0,5 – 3 ml
Katzen	0,2 – 0,5 ml

Wiederholung nach 12-24 Stunden. Maximal 2 – 4 Injektionen in Folge. Bei chronischen Zuständen ist eine wöchentliche Gabe angezeigt.

Bei Pferden wird empfohlen nicht mehr als 5 ml pro Injektionsstelle zu applizieren.

Anwendung während der Trächtigkeit und Laktation:

Kann während der Trächtigkeit und Laktation angewendet werden.

Anwendungseinschränkungen

Kontraindikationen

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber dem Wirkstoff oder einem der sonstigen Bestandteile.

Vorsichtsmassnahmen

In schweren Fällen ersetzt die Anwendung des Arzneimittels nicht andere dem Schweregrad der Erkrankung angemessene Massnahmen bzw. Therapien. Bei fortbestehenden Krankheitssymptomen ist der Tierarzt zu informieren.

Theranechron kann zusätzlich zu anderen Arzneimitteln (ausser Cortison) oder chirurgischen Massnahmen angewendet werden.

Unerwünschte Wirkungen

Häufig treten reversible lokale Reaktionen (Schwellung) an der Einstichstelle auf. Die Injektion kann an der Einstichstelle vorübergehende Schmerzhaftigkeit auslösen.

Bei längerer, nicht indizierter Anwendung von Homöopathika können Arzneimittelprüfsymptome (z.B. schmerzhaft empfindungen) auftreten.

Absetzfristen

Essbare Gewebe und Milch: Keine

Sonstige Hinweise

Bei versehentlicher Selbstinjektion oder Einnahme ist unverzüglich ein Arzt zu Rate zu ziehen und die Packungsbeilage oder das Etikett vorzuzeigen.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Bei Raumtemperatur (15-25° C) lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Der Verschlussstopfen kann bis zu 25-mal unbedenklich durchstochen werden.

Das Arzneimittel nach Ablauf des angegebenen Verfalldatums nicht mehr anwenden.

Aufbrauchfrist nach erster Entnahme: 28 Tage

Swissmedic Nr. 62'925

Abgabekategorie: B

ATCvet CODE

QV03AX

Packungen

Durchstechflaschen zu 50 ml

Hersteller

Richter Pharma AG

A-4600 Wels

Zulassungsinhaberin

Streuli Tiergesundheit AG, 8730 Uznach

Stand der Information

April 2013