

Theranechron D6 ad us. vet., solution injectable

Streuli Tiergesundheit SA

Médicament homéopathique pour injection sous-cutanée pour bovins, chevaux, moutons, chèvres, porcs, chiens, chats

Composition

1 ml de solution injectable contient :

Principe actif :

Tarantula cubensis D6 1 ml

Excipients :

Ethanolum, aqua ad injectabilia

Ce médicament vétérinaire contient env. 30% d'éthanol en masse.

Indications

Selon la conception homéopathique, Theranechron D6 ad us. vet. peut être utilisé sur prescription de votre vétérinaire dans les indications thérapeutiques suivantes:

Phlegmons, ulcères, anthrax, furoncles et processus purulents nécrosants.

Maladies inflammatoires des onglons (panaris), suppurations cutanées, états septiques. Coloration pourpre et modifications extrêmement douloureuses.

Favorise la démarcation.

Posologie / mode d'emploi

Voie sous-cutanée.

Posologie :

Bovins, chevaux 5 – 10 ml

Moutons, chèvres 3 – 5 ml

Porcs 3 – 6 ml

Chiens 0,5 – 3 ml

Chats 0,2 – 0,5 ml

Répéter après 12-24 heures. Au maximum, 2 - 4 injections consécutives. Une administration hebdomadaire est indiquée dans les états chroniques.

Chez les chevaux, il est recommandé de ne pas administrer plus de 5 ml par site d'injection.

Utilisation pendant la gestation et la lactation :

Peut être utilisé pendant la gestation et la lactation.

Limitations d'emploi

Contre-indications

Ne pas utiliser en cas d'hypersensibilité connue au principe actif ou à l'un des autres composants.

Précautions

Dans les cas sévères, l'utilisation de ce médicament ne se substitue pas à d'autres mesures ou traitements adaptés au degré de sévérité de la maladie. En cas de persistance des symptômes de la maladie, informer le vétérinaire.

Theranechron peut être utilisé en complément à d'autres médicaments (sauf la cortisone) ou mesures chirurgicales.

Effets indésirables

Des réactions locales réversibles (tuméfaction) surviennent fréquemment au site d'injection. L'injection peut provoquer des douleurs passagères au site d'injection.

En cas d'utilisation prolongée et non indiquée de médicaments homéopathiques, de nouveaux symptômes (p. ex. sensations douloureuses) peuvent survenir.

Délais d'attente

Tissus comestibles et lait : aucun

Remarques particulières

En cas d'auto-injection ou de prise accidentelle, demander immédiatement conseil à un médecin et lui montrer la notice d'emballage ou l'étiquette.

Tenir les médicaments hors de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25° C).

Conserver le flacon dans son carton pour le protéger de la lumière.

Le bouchon peut être perforé jusqu'à 25 fois sans risque.

Ne plus utiliser le médicament après la date de péremption indiquée.

Délai d'utilisation après prélèvement de la première dose : 28 jours

Swissmedic 62'925

Catégorie de remise : B

Code ATCvet

QV03AX

Emballages

Flacons de 50 ml

Fabricant

Richter Pharma AG

A-4600 Wels

Titulaire de l'autorisation

Streuli Tiergesundheit SA, 8730 Uznach

Mise à jour de l'information

Avril 2013