

## INFORMAZIONE PER I DETENTORI DI ANIMALI

L'informazione professionale destinata agli operatori sanitari può essere consultata sul sito

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

Milpro™ Gatto S ad us. vet., compresse rivestite

Milpro™ Gatto M ad us. vet., compresse rivestite

## 1 NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'OMOLOGAZIONE E, SE DIVERSO, DEL FABBRICANTE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI.

Titolare dell'omologazione:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon. Domicilio: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabbricante responsabile del rilascio dei lotti:

Virbac, 1ère avenue 2065m LID, 06510 Carros, France

## 2 DENOMINAZIONE DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Milpro Gatto S ad us. vet., compresse rivestite

Milpro Gatto M ad us. vet., compresse rivestite

## 3 PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E ALTRI INGREDIENTI

Milpro Gatto S ad us. vet., compresse rivestite

1 compressa rivestita contiene:

### Principi attivi:

Milbemicina ossima	4 mg
Praziquantel	10 mg

Milpro Gatto M ad us. vet., compresse rivestite

1 compressa rivestita contiene:

### Principi attivi:

Milbemicina ossima	16 mg
Praziquantel	40 mg

Compressa orale. Compressa ovale da beige a marrone chiaro con un solco di rottura su entrambi i lati.

## **4 INDICAZIONE(I)**

Medicinale veterinario efficace contro un ampio spettro di vermi.

Milpro Gatto è usato:

- per il trattamento delle infestazioni da anchilostoma, ascaridi e tenie. Milpro Gatto è anche efficace contro gli stadi immaturi e maturi delle *Echinococcus* spp.
- per la prevenzione della malattia del verme cardiaco (*Dirofilaria immitis*)

## **5 CONTROINDICAZIONI**

Milpro Gatto S: non utilizzare su gatti di peso inferiore a 0,5 kg

Milpro Gatto M: non utilizzare su gatti di peso inferiore a 2 kg

Non usare in casi di nota ipersensibilità al principio attivo o all'altro eccipiente.

## **6 EFFETTI COLLATERALI**

In casi molto rari (meno di 1 animale su 10 000 animali trattati, incluse le segnalazioni isolate), soprattutto nei gatti giovani, si possono osservare reazioni di ipersensibilità, sintomi come sonnolenza insolitamente pronunciata, sintomi legati al sistema nervoso (come disturbi della coordinazione motoria e tremori muscolari) e/o sintomi del tratto gastrointestinale (come vomito e diarrea) dopo la somministrazione del medicinale veterinario.

Se l'animale trattato dovesse manifestare effetti collaterali, particolarmente quelli non già menzionati in questo foglietto illustrativo, o si ritiene che il medicamento non abbia avuto effetto, si prega di informarne il medico veterinario o il farmacista.

## **7 SPECIE DI DESTINAZIONE**

Gatto

## **8 POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Dose minima raccomandata: 2 mg di milbemicina ossima e 5 mg di praziquantel per kg di peso corporeo somministrati per via orale in una volta.

Somministrare il medicinale veterinario insieme al pasto del gatto o immediatamente dopo. Milpro Gatto sono compresse rivestite da sostanze aromatizzanti, facili da somministrare (piccole compresse aromatizzate).

A seconda del peso corporeo del gatto, il dosaggio in pratica è il seguente:

<b>Peso corporeo</b>	<b>Milpro Gatto S</b>	<b>Milpro Gatto M</b>
0,5 – 1 kg	½ compressa	
> 1 – 2 kg	1 compressa	
> 2 – 4 kg		½ compressa
> 4 – 8 kg		1 compressa
> 8 – 12 kg		1½ compresse

## **9 AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

I cuccioli di gatto sono sverminati all'età di 6 settimane e poi mensilmente fino all'età di 6 mesi. I gatti adulti dovrebbero essere sverminati 4 volte all'anno.

## **10 TEMPO(I) DI ATTESA**

Non pertinente.

## **11 PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Conservare a temperatura ambiente (15°C – 25°C).

Tenere i medicinali fuori dalla portata dei bambini.

Conservare le compresse Milpro Gatto dimezzate nel blister aperto e utilizzare entro 6 mesi.

Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata sul contenitore con la dicitura EXP.

## **12 AVVERTENZE SPECIALI**

Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione:

Milpro Gatto S: peso minimo 0,5 kg

Milpro Gatto M: peso minimo 2 kg

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali:

Secondo la buona pratica veterinaria, gli animali dovrebbero essere pesati per assicurare un dosaggio accurato. Assicurarsi che i gatti e i gattini di peso compreso tra 0,5 kg e ≤ 2 kg ricevano il corretto dosaggio della compressa (4 mg di milbemicina ossima / 10 mg di praziquantel) e la dose corretta (1/2 o 1 compressa) per la rispettiva classe di peso (1/2 compressa per gatti di peso compreso tra 0,5 e 1 kg; 1 compressa per gatti di peso compreso tra > 1 kg e 2 kg).

Si raccomanda di trattare contemporaneamente tutti gli animali che vivono nella stessa casa. In caso di infestazione confermata da tenia con *Dipylidium caninum*, dopo aver consultato il veterinario, è opportuno considerare un trattamento simultaneo contro ospiti intermedi, quali pulci e pidocchi, per evitare una nuova infestazione.

Poiché il medicinale veterinario è aromatizzato, c'è il rischio che cani e gatti possano cercare selettivamente le compresse e ingerirle in quantitativo eccessivo. Per questo motivo, il preparato deve essere tenuto fuori dalla portata degli animali.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali:

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Gravidanza e allattamento:

Milpro Gatto può anche essere usato su gatte gravide e in allattamento. Le gatte che allattano dovrebbero essere trattate allo stesso tempo dei cuccioli.

Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Dopo il sovradosaggio, possono verificarsi dilatazione temporanea delle pupille (midriasi), disturbi della coordinazione motoria (atassia) e tremori muscolari (tremore), soprattutto negli animali giovani. Questi sintomi scompaiono entro un giorno senza trattamento.

### **13 PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI, SE NECESSARIO**

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali. Chiedere al proprio medico veterinario o farmacista come fare per smaltire i medicinali di cui non si ha più bisogno. Queste misure servono a proteggere l'ambiente. Milpro Gatto non deve essere disperso nei corsi d'acqua poiché potrebbe essere pericoloso per i pesci o per altri organismi acquatici.

### **14 DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

23.11.2021

Ulteriori informazioni su questo medicamento veterinario si trovano su [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) e [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

## **15        ALTRE INFORMAZIONI**

### Confezioni:

Milpro Gatto S: scatole con 2, 4 e 24 compresse in un blister di plastica e alluminio

Milpro Gatto M: scatole con 2, 4, 24 e 48 compresse in un blister di plastica e alluminio

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Categoria di dispensazione B: Dispensazione su prescrizione veterinaria

Swissmedic 65'047

Per ulteriori informazioni sul medicamento veterinario, si prega di contattare il titolare dell'omologazione indicato nella sezione 1.