

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Propentotab® 100 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens

#### 1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Virbac (Switzerland) AG, 8152 Opfikon, Domicile: Postfach 353, 8152 Glattbrugg

Fabricant responsable de la libération des lots:

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Ostlandring 13, 31303 Burgdorf, Allemagne

#### 2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Propentotab 100 mg ad us. vet., comprimés à mâcher pour chiens

#### 3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé à mâcher contient:

**Substance active:** Propentofylline 100 mg

Comprimé à mâcher rond, de couleur crème à brun clair, avec une double encoche de sécabilité sur un côté.

#### 4 INDICATION(S)

Trouble liés à l'âge chez les chiens (troubles de la microcirculation).

#### 5 CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser chez les chiens avec un poids corporel de moins de 5 kg.

#### 6 EFFETS INDÉSIRABLES

L'administration de Propentotab peut, dans de rares cas, provoquer des réactions cutanées allergiques (par ex. urticaire) nécessitant l'arrêt du traitement.

Dans de rares cas, des vomissements ont été observés, en particulier en début du traitement.  
Dans de très rares cas, des douleurs abdominales, une perte d'appétit, des diarrhées, des boiteries, une hyperactivité, un essoufflement, une accélération du rythme cardiaque et un collapsus peuvent survenir.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit:

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## **7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Chien

## **8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

La dose journalière est de 6 – 10 mg propentofylline / kg de poids corporel. Elle doit être répartie en deux prises de 3 – 5 mg/kg de poids corporel chacune comme suit:

Poids corporel (kg)	Comprimés à mâcher		Nombre de comprimés à mâcher par jour
	matin	soir	
5 – 8 kg	¼	¼	½
9 – 16 kg	½	½	1
17 – 30 kg	1	1	2
31 – 50 kg	1½	1½	3
51 – 66 kg	2	2	4
67 – 90 kg	3	3	6

## **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Une dosage plus exact peut être atteint en administrant des quarts de comprimés de 100 mg. Les comprimés à mâcher peuvent être administrés directement ou mélangés avec une petite quantité de nourriture, mais au moins 30 minutes avant le repas proprement dit.

## **10 TEMPS D'ATTENTE**

Non applicable

## **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants. À conserver en dessous de 30°C. Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte. Les comprimés divisés replacés dans un blister ouvert et conservés dans le carton jusqu'à la prochaine administration ont une durée de conservation de 4 jours.

## **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

### Précautions particulières pour chaque espèce cible:

Les comprimés à mâcher étant aromatisés, il se peut que les chiens les recherchent de manière ciblée et en avalent une quantité excessive. Les comprimés à mâcher Propentotab doivent donc être conservés hors de portée des animaux.

### Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

En cas d'insuffisance rénale avancée, il faut diminuer la dose.

Si les symptômes associés aux troubles circulatoires ne s'améliorent pas pendant l'utilisation, le traitement doit être interrompu en temps utile, selon le type de maladie, mais au plus tard après 4 semaines.

Propentotab doit être administré quotidiennement sur une longue période ou en permanence, la tolérance doit, par conséquent, être vérifiée de temps en temps. En fonction des manifestations cliniques, l'effet peut commencer déjà après quelques jours. Si le traitement est interrompu, il faut s'attendre à un retour lent des symptômes.

### Gestation et lactation:

En l'absence d'études, ne pas utiliser chez les chiennes gestantes et les animaux d'élevage.

### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Des symptômes d'hyperstimulation cardiaque et cérébrale ont été observés. Dans de tels cas, les animaux devront recevoir un traitement symptomatique.

### **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

### **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

15.06.2021.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et [www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch).

### **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Conditionnement de 100 comprimés à mâcher (sécable en quatre).

Swissmedic 65'820

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché mentionné à la section 1.