

## INFORMATION DESTINÉE AUX DÉTENTEURS D'ANIMAUX

L'information professionnelle destinée aux professions médicales peut être consultée sur le site

[www.tierarzneimittel.ch](http://www.tierarzneimittel.ch)

### NOTICE D'EMBALLAGE

Cefaseptin 75 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats

Cefaseptin 300 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

Cefaseptin 750 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

### 1 NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Vetoquinol AG, Freiburgstrasse 255, 3018 Berne

Fabricant responsable de la libération des lots:

Vetoquinol SA, Magny-Vernois, 70200 Lure, France

### 2 DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Cefaseptin 75 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens et chats

Cefaseptin 300 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

Cefaseptin 750 mg ad us. vet., comprimés sécables pour chiens

### 3 LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)

1 comprimé contient:

**Substance active:**

	<b>75 mg</b>	<b>300 mg</b>	<b>750 mg</b>
Céfalexine (sf C. monohydraté)	75 mg	300 mg	750 mg

Comprimés beiges, oblongs.

Les comprimés ont une (75 mg) voir trois rainures de sécabilité (300 mg, 750 mg) et peuvent être divisés en deux (75 mg, 300 mg, 750 mg) voir quatre (300 mg, 750 mg) parties égales.

### 4 INDICATION(S)

Traitement des maladies bactériennes provoquées par des germes sensibles à la céfalexine (en particulier staphylocoques).

Chien: surtout pour les infections

- de la peau: infections cutanées purulentes superficielles et profondes

- du tractus urinaire: inflammations rénales, infections de la vessie

- des voies respiratoires

Chat: pour les infections cutanées et sous-cutanées (plaies, abcès)

## 5 CONTRE-INDICATIONS

Allergies aux céphalosporines et aux pénicillines.

Ne pas utiliser chez les lapins, hamsters, gerbilles et cochons d'Inde.

Ne pas utiliser chez les chiots et les chatons de moins de 1 kg de poids corporel et sur les chatons de moins de 10 semaines.

## 6 EFFETS INDÉSIRABLES

Les réactions allergiques à la céfalexine sont rares, néanmoins Cefaseptin ne doit pas être administrée aux animaux présentant une intolérance connue aux céphalosporines ou aux pénicillines. Dans de rares cas, des vomissements sont observés, qui peuvent souvent être évités en administrant Cefaseptin avant l'alimentation.

La fréquence des effets indésirables est définie comme suit :

- très fréquent (effets indésirables chez plus d'1 animal sur 10 animaux traités)
- fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 100 animaux traités)
- peu fréquent (entre 1 et 10 animaux sur 1 000 animaux traités)
- rare (entre 1 et 10 animaux sur 10 000 animaux traités)
- très rare (moins d'un animal sur 10 000 animaux traités, y compris les cas isolés)

Si vous constatez des effets secondaires, même ceux ne figurant pas sur cette notice ou si vous pensez que le médicament n'a pas été efficace, veuillez en informer votre vétérinaire ou votre pharmacien.

## 7 ESPÈCE(S) CIBLE(S)

Chiens et chats

## 8 POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION

Dose recommandée = 15 mg/kg de poids corporel (PC) deux fois par jour, le matin et le soir, c'est-à-dire

Nombre de comprimés par traitement (2 traitements par jour)

Cefaseptin 75 mg		Cefaseptin 300 mg		Cefaseptin 750 mg	
Chien / Chat		Chien		Chien	
PC (kg)	Comprimés	PC (kg)	Comprimés	PC (kg)	Comprimés
1.5 - 2.5	½	7.5 - 10	½	20.0 - 25.0	½
2.6 - 5.0	1	10.1 - 15.0	¾	25.1 - 37.5	¾
5.1 - 7.5	1½	15.1 - 20.0	1	37.6 - 50.0	1
7.6 - 10.0	2	20.1 - 25.0	1¼	50.1 - 62.5	1¼
		25.1 - 30.0	1½	62.6 - 75.0	1½

La durée du traitement dépend de la gravité du cas.

Infections bénignes: 5-7 jours.

Infections chroniques, notamment les infections cutanées et les infections chroniques de la vessie: jusqu'à 30 jours.

Pour éviter un sous-dosage, le poids corporel doit être déterminé aussi précisément que possible.

Dans des cas graves ou aigus, la dose peut être doublée. Cependant, une prudence particulière est recommandée chez les chiens et les chats souffrant de maladies rénales.

Si les comprimés Cefaseptin ne sont pas pris volontairement, ils peuvent être administrés avec de la nourriture.

## **9 CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Administration orale.

## **10 TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

## **11 CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Ce médicament vétérinaire ne doit pas être utilisé au-delà de la date de péremption figurant après la mention EXP sur la boîte.

Informations sur le mode et la durée de conservation des demi-comprimés: Conserver les comprimés ouverts dans le blister d'origine et les utiliser dans les 16 heures (Cefaseptin 75 mg) ou 48 heures (Cefaseptin 300 mg et 750 mg).

## **12 MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

Précautions particulières d'utilisation chez l'animal:

En cas d'insuffisance rénale, réduire la dose.

Comme le médicament vétérinaire est aromatisé, il existe un risque que les chiens et les chats recherchent spécifiquement les comprimés et les ingèrent de manière excessive. Pour cette raison, la préparation doit être tenue hors de portée des animaux.

Précautions particulières à prendre par la personne qui administre le médicament aux animaux:

Les utilisateurs présentant une sensibilité connue à la pénicilline doivent éviter tout contact direct du médicament avec la peau ou les muqueuses.

Si l'utilisateur présente des symptômes tels que des rougeurs de la peau, il faut consulter un médecin et de lui montrer cet avertissement. Des difficultés à respirer ou un gonflement du visage, des lèvres ou des yeux sont des symptômes graves qui nécessitent une attention médicale immédiate.

#### Gestation et lactation:

L'innocuité du médicament vétérinaire n'a pas été établie en cas de gestation et de lactation.

#### Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions:

L'utilisation simultanée de la substance active céfalexine avec certaines autres substances actives peut entraîner des lésions rénales. Par conséquent, informez votre vétérinaire si vous administrez d'autres médicaments à votre animal, même si vous les avez achetés vous-même.

#### Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes):

Il n'existe aucune étude sur les surdosages pour ce médicament vétérinaire. Les conséquences éventuelles devront faire l'objet d'un traitement symptomatique.

### **13 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Ne pas jeter les médicaments dans les égouts ou dans les ordures ménagères.

Demandez à votre vétérinaire ou pharmacien pour savoir comment vous débarrasser des médicaments dont vous n'avez plus besoin. Ces mesures contribuent à préserver l'environnement.

### **14 DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

28.07.2021

Vous trouverez de plus amples informations sur ce médicament aux adresses [www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) et <http://www.tierarzneimittel.ch>.

### **15 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

75 mg und 300 mg: 10 blisters de 10 comprimés.

750 mg: 12 blisters de 6 comprimés.

Catégorie de remise B: remise sur ordonnance vétérinaire

Swissmedic 65'984

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament vétérinaire, veuillez prendre contact avec le représentant local du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché.