



## DE Evicto Spot-on ad us. vet., Lösung zum Auftropfen

Evicto 15 mg Spot-on für Hunde und Katzen bis 2,5 kg  
 Evicto 30 mg Spot-on für Hunde von 2,6 bis 5,0 kg  
 Evicto 45 mg Spot-on für Katzen von 2,5 bis 7,5 kg  
 Evicto 60 mg Spot-on für Katzen von 7,6 bis 10,0 kg  
 Evicto 60 mg Spot-on für Hunde von 5,1 bis 10,0 kg  
 Evicto 120 mg Spot-on für Hunde von 10,1 bis 20,0 kg  
 Evicto 240 mg Spot-on für Hunde von 20,1 bis 40,0 kg  
 Evicto 360 mg Spot-on für Hunde von 40,1 bis 60,0 kg

### ANTIPARASITIKUM FÜR HUNDE UND KATZEN: ZUSAMMENSETZUNG:

**Wirkstoff:** Selamectin als 6 %ige oder 12 %ige Lösung in Isopropylalkohol.  
 Evicto liegt in Einzeldosen-Kunststoffpipetten vor.  
 Eine Pipette enthält Selamectin in der Dosierung von  
 - 30 mg, 60 mg (Hund), 120 mg, 240 mg oder 360 mg als 12 %ige Lösung in Isopropylalkohol  
 - 15 mg, 45 mg oder 60 mg (Katze) als 6 %ige Lösung in Isopropylalkohol  
 Die Lösungen enthalten Butylhydroxytoluol als Antioxidans.

### EIGENSCHAFTEN / WIRKUNGEN:

Evicto enthält den Wirkstoff Selamectin, eine semisynthetische Verbindung der Avermectin-Gruppe. Wie andere Substanzen dieser Gruppe paralyisiert und/oder tötet Selamectin ein breites Spektrum invertebraler Parasiten dadurch, dass es über eine Erhöhung der Permeabilität gewisser Chlorid-Kanäle die Erregungsübertragung in den Neuronen unterbricht. Hierdurch wird die elektrische Aktivität erregbarer Zellen von Nematoden und Arthropoden gehemmt, so dass es zur Paralyse und/oder Tod kommt. Selamectin besitzt eine adultizide, ovizide und larvizide Wirkung gegen Flöhe, die sich auf dem Tier und in seiner Umgebung befinden. Somit kommt es zu einer wirksamen Unterbrechung des Lebenszyklus von Flöhen, indem erwachsene Flöhe (auf dem Tier) abgetötet werden, die Entwicklung lebensfähiger Eier verhindert wird (auf dem Tier und in seiner Umgebung) und Larven (nur in der Umgebung) abgetötet werden.  
 Organischer Detritus (Haut, Haare, Schuppen) und Flohkot von mit Evicto behandelten Haustieren töten Floheier und -larven, die zuvor nicht mit Selamectin in Berührung gekommen waren, ab und können so zu einer Kontrolle von Infestationen in der Umgebung beitragen. Die Anwendung von Selamectin ist auch bei Hunden sicher, die gegenüber anderen Avermectinen empfindlich reagieren: Versuche zeigen, dass unerwünschte Wirkungen bei Collies auch nach der Applikation der 5fachen therapeutischen Dosis nicht auftreten. Die Verträglichkeit von Selamectin wurde an reinrassigen (mehr als 100 Rassen) und gemischtrassigen Hunden, sowie an reinrassigen (16 Rassen) und gemischtrassigen Katzen geprüft. Selamectin wurde auch von trächtigen und säugenden Hündinnen und Katzen, für Zuchtzwecke genutzten männlichen und weiblichen Tieren sowie von Welpen und Jungkatzen im Alter ab sechs Wochen oder älter gut vertragen.

### PHARMAKOKINETIK:

Nach dem Auftragen auf die Haut verteilt sich Evicto innerhalb von 8 - 24 Stunden über das Fell. Bei Hunden wird nur ein geringer Anteil der verabreichten Dosis über die Haut resorbiert, wobei maximale Plasmaspiegel ca. 70 Stunden nach Applikation erreicht werden. Bei der Katze wird ein erheblicher Teil der Dosis resorbiert und maximale Plasmaspiegel treten schon 15 Stunden nach topischer Applikation auf. Eine einmalige Behandlung schützt Hunde und Katzen bis zu 4 Wochen vor erneutem Parasitenbefall.

### INDIKATIONEN:

#### Katzen und Hunde:

- Behandlung und Vorbeugung des Flohbefalls über einen Zeitraum von einem Monat nach Einzelgabe. Dies ist das Ergebnis der adultiziden, larviziden und oviziden Wirkungen des Produktes. Nach der Verabreichung wirkt das Produkt über einen Zeitraum von 3 Wochen ovizid. Über eine Reduktion der Flohpopulation unterstützt eine monatliche Behandlung von trächtigen und laktierenden Tieren ebenfalls die Vorbeugung eines Flohbefalls des Wurfs. Das Mittel kann als Teil der Behandlungsstrategie bei allergischer Flohdermatitis verwendet werden und durch seine oviziden und larviziden Wirkungen kann es dazu beitragen, die Infestation von Flöhen in der Umgebung des Tieres zu kontrollieren.
- Vorbeugung der Herzwurmerkrankung, verursacht durch *Dirofilaria immitis*, durch monatliche Behandlung.
- Behandlung und Vorbeugung des Ohrmilbenbefalls (*O. cynotis*).

#### Katzen:

- Behandlung und Vorbeugung intestinaler Stadien von Spulwürmern (*Toxocara cati*) und Hakenwürmern (*Ancylostoma tubaeforme*).
- Behandlung und Vorbeugung des Befalls mit Haarlingen (*Felicola subrostratus*).

#### Hunde:

- Behandlung und Vorbeugung des Befalls mit Haarlingen (*Trichodectes canis*).
- Behandlung und Vorbeugung der Sarcopitesräude (verursacht durch *S. scabiei*).
- Bekämpfung und Kontrolle von Spulwürmern (*Toxocara canis*).

### DOSIERUNG / ANWENDUNG:

Evicto soll einmalig äusserlich auf der Haut gemäss folgender Tabelle angewendet werden (entsprechend mindestens 6 mg Selamectin/kg Körpergewicht):

Katzen (kg)	verabreichte Menge an Selamectin	verabreichtes Volumen
unter 2,5	15 mg	0,25 ml
2,6 - 7,5	45 mg	0,75 ml
7,6 - 10,0	60 mg	1,0 ml
mehr als 10	Entsprechende Kombination der Pipetten	Entsprechende Kombination der Pipetten

Hunde (kg)	verabreichte Menge an Selamectin	verabreichtes Volumen
unter 2,5	15 mg	0,25 ml
2,6 - 5,0	30 mg	0,25 ml
5,1 - 10,0	60 mg	0,5 ml
10,1 - 20,0	120 mg	1,0 ml
20,1 - 40,0	240 mg	2,0 ml
40,1 - 60,0	360 mg	3,0 ml
mehr als 60	Entsprechende Kombination der Pipetten	Entsprechende Kombination der Pipetten

### Flohbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung

Durch die Verabreichung von Evicto werden die am Tier befindlichen erwachsenen Flöhe abgetötet, keine lebensfähigen Eier mehr produziert und auch Larven (nur in der Umgebung zu finden) abgetötet. Dadurch wird die Reproduktion der Flöhe gestoppt, der Lebenszyklus der Flöhe unterbrochen und die Infestation von Flöhen in der Umgebung des Tieres unterstützend kontrolliert.

Zur Vorbeugung von Flohbefall sollte das Mittel in monatlichem Abstand während der Dauer der Flohsaison verabreicht werden, beginnend einen Monat vor dem Aktivwerden der Flöhe. Die Reduktion der Flohpopulation durch monatliche Behandlung von trächtigen und laktierenden Tieren hilft indirekt auch einem Befall des Wurfs bis zu einem Alter von 7 Wochen vorzubeugen.

### Allergische Flohdermatitis (Katzen, Hunde): Behandlung und Kontrolle

Evicto dient zur Behandlung und Kontrolle der durch Flöhe hervorgerufenen allergischen Dermatitis bei Hunden und Katzen. Als Teil der Behandlungsstrategie gegen die allergische Flohdermatitis sollte das Mittel in monatlichen Abständen verabreicht werden. Leiden die Tiere unter einem starken Juckreiz, so ist eine gleichzeitige symptomatische Behandlung erforderlich.

### Herzwurmerkrankung (Katzen, Hunde): Vorbeugung

Um der durch *D. immitis* verursachten Herzwurmerkrankung vorzubeugen, sollte in Ländern, in denen der Überträger existiert, Evicto monatlich verabreicht werden. Evicto kann das ganze Jahr über angewendet werden, sollte allerdings zumindest innerhalb eines Monats nach dem ersten Stechmücken-Kontakt des Tieres verabreicht werden. Hieran schliesst sich die monatliche Behandlung bis zum Ende der Stechmückensaison an. Die letzte Dosis muss innerhalb eines Monats nach der letzten Mückenexposition verabreicht werden. Sollte versehentlich eine Behandlung vergessen und so das einmonatige Intervall zwischen den Anwendungen überschritten werden, wird die Möglichkeit der Entwicklung adulter Herzwürmer durch die sofortige Anwendung von Evicto und Wiederaufnahme der monatlichen Behandlung auf ein Minimum reduziert. Wenn im Rahmen eines Programms zur Vorbeugung der Herzwurmerkrankung ein anderes Produkt durch Evicto ersetzt wird, dann muss die erste Dosis Evicto innerhalb eines Monats nach der letzten Applikation des zuvor verwendeten Mittels verabreicht werden. Evicto ist bei Tieren mit einer Herzwurminfektion gut verträglich. Es wird jedoch empfohlen, dass in Endemiegebieten alle Tiere im Alter von 6 Monaten oder älter auf bestehende Herzwurminfektion untersucht werden, bevor eine Behandlung mit Evicto eingeleitet wird. Evicto besitzt keine Wirksamkeit gegen adulte *D. immitis*; es kann jedoch die Anzahl der im Blutkreislauf zirkulierenden Mikrofilarien herabsetzen.

### Ohrmilbenbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung

Auch zur Behandlung des Ohrmilbenbefalls muss das Tierarzneimittel zwischen den Schulterblättern verabreicht werden und darf nicht in den Gehörgang getropft werden.

**Katzen:** Eine einmalige Dosis von Evicto ist zu verabreichen.

**Hunde:** Evicto sollte einmalig verabreicht werden. Löst Ohrschmalz sollte vor jeder Behandlung vorsichtig aus dem äusseren Gehörgang entfernt werden. Es wird empfohlen nach 30 Tagen erneut eine klinische Untersuchung durchzuführen, da einige Tiere eine zweite Behandlung benötigen.

### Haarlingenbefall (Katzen, Hunde): Bekämpfung und Vorbeugung

Zur Beseitigung des Befalls mit Haarlingen (*Trichodectes canis* und *Felicola subrostratus*) sollte Evicto einmal als Einzeldosis verabreicht werden. Eine monatliche Anwendung von Evicto beugt möglichen Infektionen mit Haarlingen vor.

### Sarcopitesräude (Hunde): Behandlung und Vorbeugung

Zur vollständigen Beseitigung der Milben (*S. scabiei*), sollte Evicto zweimal im monatlichen Abstand verabreicht werden. Eine monatliche Anwendung von Evicto beugt möglichen Infektionen mit Sarcopitesmilben vor.

### Nematodenbefall (Hunde): Behandlung und Vorbeugung

Evicto sollte für die Behandlung des Befalls mit Spulwürmern (*T. canis*) einmal als Einzeldosis angewendet werden. Spulwurmbefall wird durch monatliche Anwendung von Evicto vorgebeugt.

### Nematodenbefall (Katzen): Behandlung und Vorbeugung


Evicto sollte für die Behandlung intestinaler Stadien von Hakenwürmern (*A. tubaeforme*) und Spulwürmern (*T. cati*) einmal als Einzeldosis angewendet werden. Haken- und Spulwurmbefall wird durch die monatliche Anwendung

von Evicto vorgebeugt.

**Flohbefall bei Welpen und Kätzchen während der Laktation: Vorbeugung**  
 Welpen und Kätzchen können vor einem Befall von Flöhen geschützt werden durch Behandlung des Muttertieres. Dieses soll zwei Wochen vor und 10 Tage nach der Geburt mit Evicto behandelt werden. Danach ist die Behandlung monatlich fortzuführen.

Selamectin ist während der Trächtigkeit und Laktation gut verträglich. Es konnten keine nachteiligen Auswirkungen weder bei den Welpen bzw. Kätzchen noch bei deren Muttertieren festgestellt werden.

### ANWENDUNGSHINWEISE:



Unmittelbar vor der Anwendung die Pipette mit Evicto aus dem schützenden Aluminium-Beutel nehmen.

**1** – Pipette aufrecht halten, Deckel entfernen.

**2** – Deckel umdrehen und das andere Ende wieder auf die Applikatorspitze aufsetzen. Deckel herunterdrücken, um die Versiegelung des Applikators zu durchstechen. Deckel vor der Applikation der Behandlung entfernen.

**3** – Die Haare am Halsansatz vor den Schulterblättern scheiteln, bis eine kleine Hautfläche sichtbar wird. Die Pipettenspitze direkt auf die Haut aufsetzen, dann die Pipette mehrmals fest zusammendrücken um den gesamten Inhalt an dieser Applikationsstelle zu entleeren. Nicht in die Auftragsstelle einmassieren. Darauf achten, dass Evicto nicht an die Finger gelangt. Nicht anwenden, wenn das Fell des Tieres nass ist. Die Wirksamkeit von Evicto wird jedoch nicht eingeschränkt, wenn das Tier zwei oder mehr Stunden nach der Behandlung gebadet wird, dem Regen ausgesetzt ist oder im Wasser schwimmt.

Während des Umgangs mit dem Arzneimittel nicht rauchen, essen oder trinken. Leicht entzündlich; von Hitze, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Lichtquellen fernhalten. Nach Gebrauch Hände waschen. Bei Hautkontakt das Mittel sofort mit Seife und Wasser abwaschen. Bei versehentlichem Augenkontakt sofort die Augen mit reichlich Wasser ausspülen und den Arzt aufsuchen sowie diesem die Packungsbeilage oder das Etikett zeigen. In seltenen Fällen kann die Anwendung des Mittels eine zeitweilige lokale Verklebung der Haare am Auftragungsort und/oder das Auftreten einer kleinen Menge einer weissen, pudrigen Substanz bewirken. Dies sind normale Reaktionen, die normalerweise innerhalb von 24 Stunden nach der Behandlung wieder verschwinden und weder die Sicherheit noch die Wirksamkeit des Mittels beeinträchtigen.

### ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

#### Kontraindikationen:

Nicht anwenden bei Tieren, die jünger als 6 Wochen sind. Diese sollen durch Behandlung des Muttertieres geschützt werden. Nicht anwenden bei Katzen, die gleichzeitig eine andere Erkrankung haben oder die geschwächt und untergewichtig (in Grösse und Alter) sind.

#### Vorsichtsmassnahmen:

Nicht oral oder parenteral verabreichen. Dieses Arzneimittel ist nur zur Applikation auf die Hautoberfläche bestimmt. Direkten Kontakt mit dem behandelten Tier vermeiden, bis die Applikationsstelle getrocknet ist. In dieser Zeit soll der Hund auch nicht baden oder schwimmen.

#### Unerwünschte Wirkungen:

Die Anwendung des Produktes bei Katzen ist in vereinzelten Fällen mit einer schwachen, vorübergehenden Alopezie an der Applikationsstelle verbunden. In sehr seltenen Fällen konnte eine vorübergehende örtlich begrenzte Reizung beobachtet werden. Alopezie und Irritation klingen normalerweise ohne Behandlung wieder ab.

Sehr selten wurden nach Anwendung des Produktes, wie bei anderen makrozyklischen Laktonen auch, reversible neurologische Ausfallserscheinungen, einschliesslich Krampfanfälle, bei Hunden und Katzen beobachtet.

#### Sonstige Hinweise:

In der Originalverpackung an einem trockenen Ort aufbewahren. Für dieses Tierarzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren. Evicto darf nicht in Gewässer gelangen, da dies für Fische und andere Wasserorganismen gefährlich sein kann. Leere Behälter und nicht verwendete Arzneimittel sollten zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden, um so eine Kontamination von Gewässern zu vermeiden. Es ist dabei sicherzustellen, dass hierbei kein missbräuchlicher Zugriff erfolgen kann.

Das Präparat darf nur bis zu dem auf der Packung mit 'EXP' bezeichneten Datum verwendet werden.

### SWISSMEDIC 67`234 (B)

ATCvet-Code: QP54AA05

### Packungen

Faltschachteln mit je 4 Pipetten.

Faltschachteln mit je 24 Pipetten.

### Zulassungsinhaber

Virbac (Switzerland) AG, Opfikon

Stand der Information: Mai 2019