

sera costapur F

DE Gebrauchsinformation

sera costapur F ad us. vet., Lösung

Zusammensetzung

Viridis malachiti oxalas 0,18 g

Formaldehydum 2,06 g

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

Anwendungsgebiete

Befall mit *Ichthyophthirius multifiliis* (weiße Pünktchen), *Trichodina*, *Chilodonella*, *Ichthyobodo* (syn. *Costia*) und anderen Protozoen (Einzeller) im Süßwasser

Befall mit *Brooklynella hostilis*, *Uronema marinum*, *Cryptocaryon irritans* und anderen Protozoen im Meerwasser

Befall mit *Saprolegnia* und anderen Pilzen

Gegenanzeigen/Nebenwirkungen

sera costapur F wird von Knorpelfischen (*Chondrichthyes*, z. B. Rochen) und von Niederen Tieren (z. B. Garnelen, Schnecken, Anemonen) nicht vertragen. Behandeln Sie die erkrankten Fische ggf. im Quarantänebecken. Einzelne Süßwasserfischarten wie Messerfische, Schmerlen und Welse gelten als sehr empfindlich gegenüber Malachitgrün-oxalat. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, beim behandelten Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrer Tierärztin / Ihrem Tierarzt oder Ihrer Apothekerin / Ihrem Apotheker mit.

Zieltierarten

Arzneimittel für Zierfischarten, ausgenommen Knorpelfische, gegen *Ichthyophthirius* (weiße Pünktchen) und andere Parasiten im Süß- und Meerwasser. Lösung als Zusatz zum Aquarienwasser.

Dosierung für jede Zieltierart, Art und Dauer der Anwendung

Vor Gebrauch schütteln! Bei den 100 ml-Flaschen ist der Spritzeinsatz nicht als Tropfer geeignet. Dosieren Sie am 1. und 3. Tag je 1 ml (22 Tropfen) auf 40 Liter Aquarienwasser, in schweren Fällen dosieren Sie zusätzlich am 5. und 7. Tag je 1 ml (22 Tropfen) auf 40 Liter Aquarienwasser. Während der Behandlung das Becken abdunkeln, die Temperatur leicht erhöhen, für gute Durchlüftung sorgen, UV-Lampen abschalten, nicht über Aktivkohle filtern. Zur restlosen Entfernung von Arzneimittelrückständen ist zwei Tage nach der letzten Dosierung eine 24-stündige

Filterung über **sera super carbon** mit einem anschließenden Teilwasserwechsel ratsam.

Besondere Lagerungshinweise

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren. Bei Raumtemperatur lagern (15 – 25 °C). Vor Licht schützen. Haltbarkeit nach dem ersten Öffnen des Behältnisses: 6 Monate. Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Behältnis mit „Verwendbar bis“ angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

Besondere Warnhinweise

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren: Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen. Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwenderin / den Anwender: Arzneimittel für Tiere. Nicht Einnehmen. Nicht Einatmen. Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhäuten vermeiden. Produkt kann färbend wirken. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen: Nicht mit anderen Arzneimitteln anwenden.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Entsorgung von nicht verwendetem Arzneimittel oder von Abfallmaterialien

Angebrochene oder abgelaufene Flaschen und gebrauchte Aktivkohle dem Restmüll zuführen. Nicht ins Abwasser geben. Restentleerte Flaschen können einer Wiederverwendung zugeführt werden.

Genehmigungsdatum der Packungsbeilage

17. April 2024

Weitere Angaben

Flaschen zu 50 ml und 100 ml

ATCvet code: QP53AX30

Abgabekategorie D: Abgabe ohne Verschreibung nach Fachberatung

Swissmedic 69819

Zugelassen im Meldeverfahren.

Falls weitere Informationen über das Tierarzneimittel gewünscht werden, setzen Sie sich bitte mit der oben genannten Zulassungsinhaberin in Verbindung.