

sera med Professional **FlagelloI**

IT Informazioni per l'uso

sera med Professional FlagelloI ad us. vet., soluzione

Composizione

Aminonitrotiazolo 14 g

Excipients ad Solutionem pro 100 ml

Indicazioni terapeutiche

I sintomi generali di un'infezione da flagellati sono: lo scurimento della livrea dei pesci, il ridotto assorbimento degli alimenti che porta a escrementi biancastri, viscosi e filiformi poichè contengono parte della mucosa dell'intestino dei pesci, gli animali diventano magri e i bordi delle pinne marciscono.

Lo *Spironucleus (Hexamita)* vive nel tratto intestinale di molti pesci, in particolare discus, scalari e altri ciclidi. Gli *Spironucleus* espulsi con gli escrementi dei pesci formano delle cisti sul fondo dell'acquario.

La malattia del buco, che si presenta con ferite o lesioni biancastre nella zona della testa, spesso si verifica dopo la moltiplicazione massiva dei flagelli.

Anche *Trichomonas*, *Bodomonas*, *Cryptobia* e *Protoopalina* possono essere presenti nell'intestino dei pesci.

Controindicazioni/effetti collaterali

I pesci cartilaginei (*Chondrichthyes*, ad es. le razze) non tollerano il **FlagelloI**. Se si notano effetti collaterali nell'animale trattato, in particolare quelli non elencati nel foglietto illustrativo, o se si sospetta che il medicinale veterinario non abbia funzionato, informare il veterinario o il farmacista.

Specie di destinazione

Prodotto medicinale per tutte le specie di pesci ornamentali, eccetto i pesci cartilaginei, contro i flagellati (*Spironucleus/Hexamita*) o la malattia del buco, in acqua dolce. Soluzione come additivo all'acqua dell'acquario.

Dosaggio per ogni specie animale di destinazione, tipo e durata della somministrazione

Agitare bene prima dell'uso! Dosare 1 ml di **FlagelloI** per 40 litri di acqua dell'acquario. Distribuire il prodotto sulla superficie dell'acqua dal misurino, mescolandolo nell'acquario con un cucchiaino o una bacchetta. I filtri biologici possono rimanere in funzione, ma devono essere puliti prima del trattamento in caso di forte inquinamento. Durata del trattamento: da 3 a 7 giorni (in caso di forte infestazione). Successivamente effettuare un cambio d'acqua almeno dell'80 % per eliminare il medicinale, al fine di evitare l'intorbidimento batterico con il conseguente

consumo di ossigeno. Se si verifica torbidità, effettuare immediatamente un cambio d'acqua dell'80 %, ridosare il medicinale e terminare il trattamento. Assicurare una buona aerazione durante il trattamento, spegnere lampade UV, non filtrare attraverso il carbone attivo.

Particolari precauzioni per la conservazione

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura ambiente (15 – 25 °C). Proteggere dalla luce. Non usare più questo medicamento veterinario dopo la data di scadenza indicata con la dicitura "Utilizzabile fino al".

Avvertenze speciali

Precauzioni speciali per l'impiego negli animali: Da non somministrarsi ad animali destinati all'alimentazione umana. Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicamento veterinario agli animali: Medicinali per animali. Non ingerire. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e le mucose. Il prodotto può macchiare. Interazione con altri medicinali e altre forme d'interazione: Non può essere usato contemporaneamente ad altri prodotti curativi. Per quanto è noto, il **FlagelloI** è ben tollerato dai gamberetti e dalle piante acquatiche.

Precauzioni speciali per lo smaltimento dei medicinali veterinari inutilizzati o dei materiali di scarto derivanti dall'uso di tali prodotti

Smaltire i flaconi aperti o scaduti con i rifiuti residui. Non smaltire nelle acque di scario. I flaconi vuoti possono essere riciclati.

Data dell'ultima revisione del foglietto illustrativo

18 aprile 2024

Ulteriori informazioni

Flaconi da 10 e 50 ml

Codice ATCvet: QP51AX

Categoria di somministrazione D: somministrazione senza prescrizione medica dopo consulenza specialistica

Swissmedic 69825

Autorizzato secondo la procedura di notifica.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, contattare il titolare dell'autorizzazione sopra indicato.