

Bovicalc[®] P

**Aliment minéral complémentaire pour vaches
Bolus pour un apport en phosphore lors de périodes de besoin
élevé**

Contenu

Composition:

1 bolus de 195 g contient:
Phosphate monocalcique, propylène glycol
Correspond à: 31 g de phosphore et 20 g de calcium

Composants analytiques:

Eau 22,0 % ; cendres brutes 52% ; cendres insolubles dans HCl 10.1% ; phosphore 15.9% ; calcium 10,3%, magnésium 0.0% ; sodium 0,0%

Possibilités d'utilisation

Amélioration de l'apport en phosphore chez les vaches lors du vêlage.
Vaches ayant un manque aigu en phosphore lors d'une alimentation réduite.

Mode d'emploi / usage

Il est recommandé avant l'utilisation, de prendre l'avis d'un spécialiste.
Administration orale à l'aide de l'applicateur de bolus, conformément au mode d'emploi.


Lors d'un déficit en phosphore attendu autour du temps de vêlage: 2 boli par vache :

Le 1er bolus lorsque la vache présente des signes imminents de vêlage.
Le 2ème bolus directement après le vêlage
Si nécessaire l'administration peut-être poursuivie.


Alimentation complémentaire lors d'un déficit simultané en Ca et en P autour du vêlage:

Lorsque la vache présente des signes imminents de vêlage :
Administer le 1er bolus de Bovicalc[®] P et le 1er bolus de Bovicalc[®] l'un après l'autre
Directement après le vêlage:
Administer le 2ème bolus de Bovicalc[®] P et le 2ème bolus de Bovicalc[®] l'un après
l'autre.
Continuer l'administration de Bovicalc[®] comme suit: Administer le 3ème bolus de
Bovicalc[®] 12 h et le 4ème bolus de Bovicalc[®] 24 h après le vêlage.

Utilisation correcte de l'applicateur



Placer le bolus dans l'applicateur, l'extrémité ronde en avant. Presser le bolus dans l'applicateur jusqu'à la butée (verrouillage de la pince).



Soulever la tête de la vache et lui ouvrir la bouche avec la main. Avec l'autre main, introduire l'applicateur avec précaution au fond de la gueule.



La langue présente une certaine résistance qu'il faut surmonter avec précaution. Ne libérer le bolus en pressant sur le piston qu'après avoir introduit l'applicateur le plus profondément possible.



Attendre un instant jusqu'à ce que la vache avale le bolus. Retirer l'applicateur avec précaution.

Autres remarques

Mises en garde

Ne doit pas être administré à une vache en position couchée.

Utiliser uniquement les applicateurs spéciaux pour Bovikal[®]

ATTENTION! Ne pas administrer de boli brisés ou endommagés.

Conditions de conservation

Conserver à l'abri du gel et de l'humidité !

Les boli Bovikal[®] P doivent être conservés dans les tubes en plastique jusqu'au moment de l'utilisation !

Présentation

Emballage de 4 boli à 195 g

Fabricant

α-DE-BY-1-00022

Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle
CH 32009

Mise à jour de l'information

02/2019