

Equitop Pronutrin®

Aliment complémentaire diététique pour la réduction des réactions au stress chez les chevaux

Contenu

Composition

Pulpe de fruits déshydratées et purée de légumes, sucre, marc de pommes, glycérine

Additifs

Lécithine (1c322) 9%

Composants analytiques

Protéines brutes	5,7%
Matières grasses brutes	9,0%
Fibres alimentaires brutes	13,5%
Cendres brutes	2,7%
Magnésium	0,2%
Sodium	0,1%

Propriétés

L'ingrédient diététique d'Equitop Pronutrin® est l'Apolectol®, un complexe breveté de pectine, lécithine et glycérine. Les propriétés des différents ingrédients d'Apolectol® se complètent dans leur ensemble en un aliment complémentaire diététique.

Equitop Pronutrin® apporte une supplémentation nutritive aux chevaux présentant des symptômes gastriques de réactions au stress, tels que: manque d'appétit, baisse des performances, perte d'appétit, perte de poids, mauvais état général, bruxisme, colique, hypersalivation et tic à l'appui.

Mode d'emploi / usage

Pour la réduction des réactions au stress dans le système gastro-intestinal en complément de la nourriture ordinaire avant ou pendant:

- Une performance élevée
- Nourrissage de doses élevées de concentrés
- Modification de l'alimentation
- Réduction ou privation alimentaire

- Transport
- Sevrage des poulains
- Lors de conflits d'hierarchie sociale
- Opérations
- Dans d'autres situations lorsqu'il y a un besoin général de nutriments supplémentaires pour soutenir la muqueuse gastrique.

Dosage

1 x par jour 50 g d'Equitop Pronutrin[®] par 100 kg de poids corporel à mélanger avec le fourrage (le gobelet gradué est inclus).

La dose peut être initialement réduite de moitié pour habituer le cheval, puis augmentée sur 2 à 3 jours jusqu'à la dose recommandée. En cas de prise de fourrage différée ou mauvaise, la dose peut être répartie en 2 portions journalières de 25 g/100 kg de poids corporel.

La période d'affouragement devrait être de 2 à 4 semaines.

Si l'état général du cheval s'est normalisé ou amélioré, le traitement devrait tout de même être poursuivi pendant 2 semaines supplémentaires pour éviter les rechutes.

En cas de besoin, une administration de longue durée ou intermittente est possible.

Chevaux de course et trotteurs

La dose quotidienne d'Equitop Pronutrin[®] doit être donnée avant l'entraînement ou la course.

Poulains

Pour les poulains allaités, la quantité recommandée d'Equitop Pronutrin[®] doit être mélangée avec 3 fois sa quantité en eau tiède. Après 2 à 3 minutes, la bouillie peut être administrée directement dans la bouche du poulain à l'aide d'une seringue ou d'une bouteille en plastique.

Chez les chevaux malades qui refusent la prise de fourrage, Equitop Pronutrin[®] peut également être administré en bouillie et par une sonde naso-œsophagienne.

Remarques particulières

Avant l'utilisation du complément alimentaire ou avant le prolongement de la durée d'administration veuillez consulter votre vétérinaire.

Equitop Pronutrin[®] peut être administré sans aucun problème avant ou pendant les compétitions. Il ne contient aucune substance dopante.

Conserver au sec et en dessous de 25 °C.

Présentation

Seau de 3,5 kg

Cette quantité suffit pour un cheval de taille moyenne pendant 14 jours.

Fabricant

Boehringer Ingelheim Animal Health Denmark A/S

208-R854833

Distributeur

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Bâle

CH 32009

Mise à jour de l'information

02/2019