

## Tris-NAC®

### Agent tampon Tris-EDTA + N-Acétylcystéine

Combinaison synergique contre la formation de biofilm pour application topique et auriculaire chez les chiens et les chats

### Composition


N-Acétylcystéine (NAC), Tris-EDTA

### Propriétés

Tris-NAC® est une combinaison innovante et synergique de NAC et Tris-EDTA qui peut être utilisée comme soutien pour empêcher la formation d'un biofilm bactérien. En cas de biofilm déjà présent Tris-NAC® favorise sa dégradation.

### Mode d'emploi

1. Dévisser le capuchon de fermeture **A**
2. Retirer la feuille d'argent du capuchon de fermeture **B**
3. Mettre en place le capuchon de fermeture **B** et le visser à fond
4. Enforcer complètement la partie intérieure du bouchon **B**
5. Bien agiter le flacon
6. Prélever la quantité recommandée de solution dans le flacon à l'aide de la seringue **C** fournie dans l'emballage et l'appliquer



**Dans le canal auditif :** Si nécessaire, nettoyer le canal auditif avec un nettoyant auriculaire à base aqueuse (p. ex. Otoact<sup>®</sup>, Clorexyderm<sup>®</sup> Oto Più). Remplir le canal auditif avec Tris-NAC<sup>®</sup> ou, à titre prophylactique, verser environ 1 à 3 ml de la solution dans le canal auditif. Masser doucement la base d'oreille et laisser agir pendant 2 minutes. Retirer l'excédent de produit et, après environ 30 minutes, appliquer si nécessaire un produit thérapeutique pour l'oreille.

**Sur la peau :** Appliquer la quantité nécessaire sur les zones concernées jusqu'à ce qu'elles soient complètement recouvertes. Laisser agir 2 à 3 minutes, ne pas rincer le produit. Après l'application de Tris-NAC<sup>®</sup>, le traitement ultérieur éventuellement nécessaire peut être effectué après 20–30 minutes à l'aide d'un antibiotique ou un antiseptique.

**Petits zones cutanées (par ex. espace interdigitales, plaies etc.) :** Appliquer Tris-NAC<sup>®</sup> avec une gaze stérile, laisser agir et appliquer un traitement topique complémentaire.

### **Durée d'utilisation**

Au début 1 à 2 fois par jour pendant 10–14 jours, puis 2 à 3 fois par semaines pendant 3 (jusqu'à 5) semaines, ensuite selon les besoins ou les instructions de votre vétérinaire.

### **Autres remarques**

- **Uniquement pour usage externe, ne convient pas pour l'usage oral.**
- Conserver le flacon à température ambiante et le protéger des rayons du soleil
- **Durée de conservation après première ouverture :** 50 jours
- Conserver hors de portée des enfants
- Jeter le flacon avec les ordures ménagères après usage

### **Présentation**

Flacon de 120 ml

### **Fabricateur**

ICF / nextmune  
Via G.B. Benzoni 50  
It- 26020 Palazzo Pignano  
[www.icfpet.com](http://www.icfpet.com)

### **Mise à jour de l'information**

Septembre 2022